



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MICHELE PALMIERI
MARIA ROSARIA DELLA ROCCA
MICHELE RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
61	20/02/2026	213	00	00

Oggetto:

Aggiornamento delle 'Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e manuale tecnico di Campionamento'

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la Biodiversità, intesa come ricchezza di habitat, di ecosistemi, di paesaggi, di specie animali e vegetali, è riconosciuta dalla Comunità Europea come valore universale;
- b. la salvaguardia, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali, degli ecosistemi, dei paesaggi, della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo prioritario di interesse generale perseguito dalla Comunità Europea;
- c. la Regione Campania contribuisce in modo significativo alla crescita e diffusione della Biodiversità nazionale grazie alla presenza sul proprio territorio di numerosi ambienti naturali, paesaggi ed ecosistemi che ospitano una fauna e una vegetazione di elevato pregio ecologico;
- d. in attuazione delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta della Regione Campania, ha classificato n. 31 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e designato n. 108 Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- e. è primario interesse dell'Amministrazione Regionale assicurare ogni forma di tutela e valorizzazione del proprio ricco patrimonio naturale attraverso l'attuazione di appropriati interventi di conservazione e di monitoraggio delle specie e degli habitat presenti nei Siti "Natura 2000";
- f. con decreto del 17/10/2007, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato i "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- g. le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla raccolta dei dati necessari alla valutazione periodica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che

- a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 27/12/2017 sono state approvate le "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania";
- b. con Decreto Dirigenziale della UOD 05.06.07 n. 12 del 26/09/2018 sono state approvate le "Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e Specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne e manuale tecnico di campionamento", successivamente aggiornate con Decreto Dirigenziale n. 50 del 18/11/2021;
- c. con la Delibera di Giunta Regionale n. 617 del 14/11/2024 sono state approvate le misure di conservazione e i piani di gestione di 57 siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania, sostituendo quanto previsto dalla D.G.R. n. 795/2017 per i medesimi siti;
- d. il Manuale Tecnico di Campionamento costituisce documento tecnico operativo elaborato sulla base dei Manuali di monitoraggio di habitat e specie di importanza comunitaria predisposti da ISPRA e necessita di aggiornamento periodico in relazione alle nuove conoscenze e metodologie condivise dalla comunità scientifica;
- e. la Regione Campania ha finanziato, a valere sul PSR Campania 2014-2020 – tipologia di intervento 7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione

dei siti Natura 2000” – nonché mediante il “Progetto straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l’infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000”, la redazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 della Regione Campania;

CONSIDERATO altresì che

- a. nel corso delle suddette attività è emersa l’esigenza di procedere all’aggiornamento del Manuale Tecnico di Campionamento per il monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania;
- b. la Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e sostenibilità, con il supporto dell’UOS competente in materia, ha provveduto all’aggiornamento del Manuale al fine di rendere le metodologie di indagine più efficaci e adeguate al contesto regionale, nonché di garantire l’uniformità delle modalità di monitoraggio da parte dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000;

RITENUTO che

- a. di dover approvare l’aggiornamento delle “Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e Specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e del relativo Manuale Tecnico per il Campionamento”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

- a. la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, ed in particolare l’art. 4, c 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione;
- b. la Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
- c. la Direttiva 92/43/CEE;
- d. la Direttiva 79/409/CEE;
- e. il D.P.R. n. 357/1997;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n.795/17;
- g. la Delibera di Giunta Regionale n.684/2019;
- h. la Delibera di Giunta Regionale n. 617/2024

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOS 213.02.02 -Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000- e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato

1. di approvare l’aggiornamento delle “Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e Specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e del relativo Manuale Tecnico per il Campionamento”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento completo di Allegato 1 a:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ecologica;
- Assessore all'Ambiente della Giunta regionale;
- Assessore alla Biodiversità della Giunta regionale;
- alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione;
- al sito istituzionale per la pubblicazione nella sezione "Casa di vetro";
- soggetti gestori dei siti Natura 2000;
- all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali.

DOTT. MICHELE PALMIERI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa



Direzione Generale Difesa del Suolo, Ecosistema e Sostenibilità

**Linee guida per il Piano di monitoraggio
di Habitat e specie di interesse comunitario
terrestri e delle acque interne della Campania
e manuale tecnico per il campionamento**



Versione 3 - 2025

Direzione Generale - Difesa del Suolo, Ecosistema e Sostenibilità
Direttore Generale Dott. Michele Palmieri

Settore - Sviluppo sostenibile; qualità dell'aria; gestione delle risorse naturali protette, tutele e salvaguardia dell'habitat marino e costiero
Dirigente: Ing. Maria Rosaria Della Rocca

UOS - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000
Dirigente: Ing. Michele Rampone

Supporto tecnico scientifico e redazione del Manuale tecnico per il campionamento:

Gabriele de Filippo



Annalisa Santangelo



Sandro Strumia



Indice

Introduzione	4
Il quadro di riferimento.....	4
Glossario	5
Strategie di monitoraggio	6
Obiettivi	6
Criteri	6
Quadro programmatico.....	7
Programmazione delle attività	7
Primo livello di monitoraggio	7
Secondo livello di monitoraggio	7
Regime autorizzativo	8
Manuale tecnico per il campionamento.....	9
Introduzione.....	9
Campionamento degli Habitat	13
Carta di distribuzione e campionamenti.....	13
Valutazione dello stato di conservazione	15
Schede metodologiche per gli Habitat.....	16
Campionamento delle specie vegetali.....	65
Carte di distribuzione	65
Campionamenti	65
Valutazione dello stato di conservazione	66
Schede metodologiche per le specie vegetali	67
Campionamento delle specie animali	74
Carte di distribuzione.....	74
Stato di conservazione.....	75
Schede metodologiche per gli invertebrati.....	76
Schede metodologiche per i pesci	85
Schede metodologiche per gli anfibi	87
Schede metodologiche per i rettili.....	88
Schede metodologiche per i mammiferi.....	92
Schede metodologiche per gli uccelli.....	95
Conservazione e gestione dei dati.....	116
Habitat.....	116
Specie vegetali	117
Specie animali	118
Bibliografia.....	121
Allegati	125
Schede di campo per i campionamenti degli Habitat.....	125
Schede di campo per i campionamenti delle specie vegetali	128
Schede di campo per i campionamenti delle specie animali.....	131

INTRODUZIONE

Il quadro di riferimento

L'art. 11 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) prescrive che gli Stati Membri garantiscano la sorveglianza dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie di interesse comunitario (elencati negli all. I, II, IV e V). Tale sorveglianza è necessaria anche per le specie di all. I della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e per le specie migratrici abituali nelle Zone di Protezione Speciale.

Il DPR 357/97 (art. 7 comma 2) impone alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il compito di disciplinare l'adozione del monitoraggio dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie di interesse comunitario, tenendo conto delle Linee guida definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con proprio decreto (art. 7, comma 1). Il monitoraggio deve essere effettuato sia all'interno che all'esterno della rete dei Siti Natura 2000, comprendendo attività nell'intero territorio regionale.

Il presente Piano di monitoraggio programma le attività da realizzare in Regione Campania per adempiere ai suddetti obblighi e definisce le metodologie da utilizzare, considerando solo le specie e gli Habitat terrestri e delle acque interne; per quelli marini si rimanda al Piano di monitoraggio previsto per l'attuazione della Strategia Marina. I due Piani, comunque, sono da intendersi complementari e sinergici.

Il presente Piano, altresì, comprende le attività previste nelle misure di conservazione sito specifiche e in eventuali piani di gestione dei siti NATURA 2000.

Per la redazione di questo documento si è fatto riferimento a documenti del MASE; in particolare:

Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 (Decr. 3 settembre 2002)

Linee guida per le Regioni e Province Autonome in materia di monitoraggio (2014)

Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia (Angelini *et al.* 2016, Ercole *et al.* 2016, Stoch e Genovesi 2016)

Nella prima parte del Piano (Strategie di monitoraggio) si definiscono le strategie adottate, in particolare i criteri seguiti nelle scelte metodologiche e programmatiche, tenendo conto degli obiettivi del Piano.

Segue il Quadro programmatico e finanziario, in cui vengono indicate le diverse attività e individuate le risorse finanziarie con le quali la Regione Campania renderà operativo lo stesso Piano, consentendo la sua concreta attuabilità.

L'ultima parte costituisce il Manuale tecnico, in cui si individuano le metodologie e le procedure operative per i campionamenti in campo, per le successive elaborazioni degli indicatori e per la conservazione dei dati, separatamente per ogni componente (Habitat, specie vegetali, specie animali).

Glossario

Ai fini del presente documento si useranno le seguenti definizioni:

Campionamento: insieme di attività di campagna atte a rilevare parametri relativi ad un Habitat o una specie all'interno di un'unità di campionamento

Dimensioni del plot: indicazione dell'estensione del plot, espressa in unità di superficie o come lunghezza del raggio nel caso di plot di forma circolare

Direttiva Habitat: la direttiva 92/43/CEE

Direttiva Uccelli: la direttiva 2009/147/CE

Forma del plot: indica se il plot debba essere di forma quadrata, rettangolare, circolare o di altra forma.

Frequenza di monitoraggio: intervallo previsto tra una sessione di monitoraggio e l'altra, espresso in anni

Frequenza spaziale di campionamento nel Sito: numero di repliche spaziali all'interno della stessa sessione di monitoraggio.

Frequenza temporale: numero di repliche temporali all'interno della stessa sessione di monitoraggio.

habitat (con iniziale minuscola e riferito ad una specie): ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico (cfr. DPR 357/1997 e ss.mm.ii. all'art. 2 lettera f)

Habitat (con iniziale maiuscola): Habitat di importanza comunitaria così come definiti nel D.P.R. 8-9-1997 n. 357 e ss.mm.ii e come elencati nell'allegato A dello stesso DPR e nei seguenti documenti:

- Manuale italiano di interpretazione degli Habitat prodotto nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e dalla Società Botanica Italiana (<http://vnr.unipg.it/Habitat/>), (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/manuale_interpretazione_Habitat_it.pdf) ed eventuali successive modifiche
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 11 luglio 2011 n. 484 (2011/484/UE)
- The Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28 prodotto nel 2013 ed eventuali aggiornamenti successivi

Periodo di campionamento: indica i mesi dell'anno solare in cui svolgere il campionamento

Plot: unità elementare di superficie, forma e dimensione variabile in accordo a quanto previsto dalla metodologia di campionamento; al suo interno vengono raccolti i parametri utili alla definizione degli indicatori dello stato di conservazione degli Habitat o delle specie oggetto del monitoraggio

Plot permanenti: plot la cui posizione sul territorio viene definita attraverso georeferenziazione e mantenuta costante nel tempo al fine di valutare le variazioni dei parametri rilevati

Popolazione: insieme di individui appartenenti ad una specie che vivono all'interno di un Sito o utilizzano, anche in modo non esclusivo, il territorio del Sito, o parte di esso, per le proprie funzioni vitali, nell'arco temporale di riferimento di una sessione di monitoraggio.

Porzione del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD): porzione di territorio identificata omogenea secondo alcuni parametri ambientale, ad esempio per tipologia di vegetazione, altezza degli alberi, tipo di sponda fluviale, ecc. Viene utilizzata per localizzare le unità di campionamento in maniera congruente all'habitat della specie da controllare.

Repliche spaziali: insieme delle unità di campionamento aventi stesse caratteristiche e posizionati in luoghi differenti in cui viene ripetuto il campionamento rilevando gli stessi parametri per lo stesso Habitat o per la stessa specie

Repliche temporali: - numero di volte in cui viene ripetuto il campionamento di una specie, in periodi differenti della stessa sessione di monitoraggio

Sessione di monitoraggio: l'insieme dei campionamenti effettuati in un Sito nello stesso anno solare e relativi ad uno stesso Habitat o specie

Sito (con iniziale maiuscola): il Sito di Importanza Comunitaria, la Zona Speciale di Conservazione o la Zona di Protezione Speciale

Stazione: luogo in cui più individui della specie vegetale sono presenti in condizioni omogenee di esposizione, quota, inclinazione, substrato

Transetto: tracciato lineare lungo il quale disporre i plot, le unità o le stazioni di campionamento all'interno dei quali viene effettuato il campionamento, oppure (nel solo caso delle specie animali) lungo il quale effettuare il campionamento

Unità di campionamento: porzione di territorio (plot, transetto o altro) entro cui viene effettuato il campionamento dei parametri dell'Habitat o della specie

STRATEGIE DI MONITORAGGIO

Obiettivi

Obiettivi fondamentali del Piano di Monitoraggio della Regione Campania sono i seguenti:

1. valutare lo stato di conservazione di Habitat e specie di interesse comunitario all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 in Campania;
2. valutare l'efficacia delle misure di conservazione Sito-specifiche adottate dai soggetti gestori;
3. aggiornare gli obiettivi di conservazione Sito-, Habitat- e specie- specifici nei Siti Natura 2000, in accordo ad una gestione di tipo adattativo;
4. fornire dati utili per l'eventuale aggiornamento dei Formulare Standard dei Siti Natura 2000 della Regione Campania;
5. definire la distribuzione e lo stato di conservazione di Habitat e specie di interesse comunitario non comprese nei Siti della Rete Natura 2000;
6. fornire dati utili al MASE ai fini del rapporto sullo stato di attuazione delle direttive da effettuare ogni sei anni (art. 17 Direttiva Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli)

Un ultimo obiettivo di tipo generale è la verifica e l'aggiornamento di questo piano di monitoraggio in funzione del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

Criteri

Il Piano regionale di monitoraggio è impostato su un principio fondamentale: la sua concreta attuabilità.

Va premesso che il monitoraggio di Habitat e specie è un'operazione complessa, che richiede l'impiego di risorse umane altamente specializzate e tempi di attuazione vincolati ai tempi biologici delle specie vegetali ed animali che rappresentano il vero oggetto del campionamento. Inoltre il monitoraggio, inteso come valutazione di eventuali variazioni nel tempo, non può intendersi come unico evento occasionale, ma svolge appieno il suo compito solamente se ne è garantita la ripetibilità costante nel tempo. Le disponibilità economiche pertanto non devono solamente essere adeguate, ma soprattutto certe e costanti. Solo in questo modo è possibile ottenere informazioni che permettano di attuare una gestione adattativa che tenga conto dei risultati ottenuti con le misure di conservazione previste ed eventualmente individuare le necessarie modifiche.

Pertanto, al fine di rendere il monitoraggio effettivamente realizzabile in base a stime realistiche di disponibilità di risorse umane ed economiche, nella scelta dei parametri da rilevare, dei metodi di campionamento e del relativo sforzo e frequenza, descritti in questo Piano nel capitolo "Manuale tecnico per il campionamento", si è tenuto conto delle seguenti esigenze:

il monitoraggio dello stato di conservazione deve avvenire per mezzo di indicatori che devono essere semplici, ridotti in termini numerici e facilmente comprensibili;

il calcolo di questi indicatori deve avvenire a partire da dati (parametri grezzi) prevalentemente raccolti in campo attraverso un campionamento che sia il più speditivo possibile, con conseguente riduzione dei tempi necessari e con risparmio in termini di risorse economiche e umane;

le competenze necessarie al campionamento devono essere effettivamente disponibili tra le professionalità presenti sul mercato del lavoro o acquisibili in tempi compatibili con le esigenze di monitoraggio;

i risultati del monitoraggio devono essere comparabili in serie temporali all'interno di ciascun Sito, anche se effettuati da operatori diversi nel tempo.

Per ottimizzare le risorse disponibili, si assegnerà priorità alle azioni di monitoraggio degli Habitat e delle specie di all. I e II della Direttiva Habitat e delle specie nidificanti di all. I della Direttiva Uccelli all'interno dei Siti Natura 2000, rispetto a quelle relative alle specie vegetali ed animali di all. IV e V della Direttiva Habitat.

QUADRO PROGRAMMATICO

Programmazione delle attività

Il Piano di monitoraggio prevede due livelli esecutivi: 1) un primo livello che prevede azioni estese a tutti gli Habitat e a tutte le specie di interesse comunitario su tutto il territorio regionale; 2) un secondo che prevede azioni effettuate in base ad esigenze Sito-specifiche.

Primo livello di monitoraggio

Le azioni previste dal primo livello sono indicate di seguito:

realizzazione e aggiornamento delle carte di distribuzione e valutazione dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie di all. I e II della Direttiva Habitat e delle specie nidificanti di all. I della Direttiva Uccelli all'interno della Rete Natura 2000; queste carte dovranno essere realizzate tenendo conto delle specifiche illustrate nel "Manuale tecnico per il campionamento" di questo documento;

realizzazione e aggiornamento carte di distribuzione e valutazione dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie di all. I e II della Direttiva Habitat e delle specie nidificanti di all. I della Direttiva Uccelli all'esterno della Rete Natura 2000 attraverso ricerche mirate in base a segnalazioni della comunità scientifica o di altre fonti affidabili;

raccolta di dati utili al monitoraggio delle specie di all. IV e V della Direttiva Habitat, sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000, grazie ai dati derivati dalle attività previste nel "Manuale tecnico per il campionamento" in questo documento, oppure, nel caso di specie a vasto areale sul territorio regionale e molto diffuse (esempio *Podarcis siculus*, *Ruscus aculeatus*, *Galanthus nivalis*), di dati provenienti da progetti, coordinati dalla Regione Campania, che prevedano il coinvolgimento di ricercatori, cittadini e associazioni, in un approccio di *citizen science*. Esperienze in questo senso (indagini con metodi di *citizen science*) sono state già avviate dalla Regione Campania nell'ambito delle attività previste dalla rete INFEA (annualità: 2017; progetto: Monitoraggio di specie vegetali in Campania, a cura dell'Università della Campania "L. Vanvitelli").

Le azioni elencate si svolgeranno nel periodo 2025-2023 e i loro risultati saranno confrontati con quelli precedenti che costituiscono il dato al "punto zero" del monitoraggio pluriennale, anche per fornire informazioni utili per i Rapporti che si redigono ogni 6 anni ai sensi dell'art. 17 Direttiva Habitat e dell'art. 12 Direttiva Uccelli.

Conservando il principio di programmare solo le attività realmente realizzabili in base alle risorse disponibili, si è prevista nella maggior parte dei casi una frequenza di monitoraggio pari a 6 anni. Pertanto ogni 6 anni si provvederà ad aggiornare le carte e lo stato di conservazione degli Habitat e delle specie di interesse comunitario, utilizzando le medesime metodologie individuate per la definizione del "punto zero". Si è considerato, infatti, che:

l'arco di tempo di 6 anni sia sufficiente per individuare modifiche dello stato di conservazione in tempo utile per attivare misure che arrestino eventuali processi a impatto negativo su Habitat e specie;

per valutare l'efficacia delle Misure di conservazione in relazione agli obiettivi Habitat/specie - specifici, sia necessario un periodo solitamente superiore a 3-4 anni, sufficiente a valutare le risposte ecologiche delle popolazioni al variare delle condizioni ambientali.

Solo per alcuni Habitat o specie, essendo noti processi in atto che stanno agendo negativamente su di essi, si è prevista una maggiore frequenza di monitoraggio; in tali casi la frequenza prevista è indicata nella scheda Habitat/specie - specifica.

Secondo livello di monitoraggio

Il secondo livello esecutivo prevede azioni richieste da esigenze di conservazione Sito-specifiche. In pratica, si tratta di verificare variazioni dello stato di conservazione di Habitat o specie in un determinato Sito, a causa di esigenze di conservazione non generalizzabili all'intera Rete Natura 2000, ma rese necessarie da peculiari condizioni ambientali, esigenze socio-economiche locali, pressioni o minacce che possono verificarsi nel Sito considerato. Tali esigenze, di norma, sono definite nelle misure di conservazione sito specifiche o nei piani di gestione. A tal fine sono richiesti approfondimenti non compresi nelle tecniche di monitoraggio considerate in questo Piano.

Questi monitoraggi rappresentano generalmente una risposta al verificarsi delle condizioni descritte di seguito.

Presenza nel Sito di pressioni e/o minacce (anche derivanti da particolari esigenze economiche degli *stakeholder*) individuate nelle misure di conservazione e nei Piani di Gestione (ove disponibili) che possono rappresentare un elemento di disturbo ai fini degli obiettivi di conservazione Habitat- e/o specie- specifici. Il monitoraggio delle pressioni e minacce potrà avvenire, a discrezione del soggetto gestore, sia direttamente, controllando la loro intensità ed evoluzione temporale, sia indirettamente, attraverso indicatori ambientali, compresi quelli biologici. Considerata la varietà delle possibili minacce e pressioni da

controllare e dei possibili relativi indicatori, in questo Piano non sono state individuate metodologie standard da seguire; per esse si rimanda alla vasta letteratura scientifica disponibile.

Presenza nel Sito di situazioni, attualmente non prevedibili, in cui sia necessario condurre le azioni di monitoraggio più frequentemente su alcuni Habitat e/o specie; infatti, per quanto si ritenga sufficiente un arco di sei anni per individuare eventuali modifiche dello stato di conservazione al fine di attivare misure correttive, si ritiene possibile che talvolta sia necessario abbreviare i tempi del monitoraggio (gestione adattativa). In tali casi, il soggetto gestore dovrà assicurare campionamenti e valutazioni dello stato di conservazione e/o dell'efficienza delle misure di conservazione, utilizzando i medesimi protocolli metodologici descritti nel Manuale tecnico.

Presenza nel Sito di Habitat e/o specie di cui sia necessario approfondire alcuni aspetti relativi alla loro biologia/ecologia ai fini della valutazione dello stato di conservazione o per verificarne l'effettiva presenza, con tecniche non necessariamente previste in questo Piano. Ad esempio, potrebbe essere necessario valutare la variabilità genetica di una popolazione isolata per prevenire fenomeni di depressione da *inbreeding*, oppure valutare gli effetti di un predatore sulla popolazione di una specie di interesse comunitario, ecc. In questo caso le tecniche di indagine sono così numerose e differenti che non è possibile prevedere metodologie standard in questo Piano. Per queste azioni di monitoraggio, per quanto possibile, si farà comunque riferimento ai protocolli previsti dal presente documento, nonché ai manuali di monitoraggio degli Habitat e delle specie di importanza comunitaria redatti da ISPRA. Solo quando questi risultino inefficaci per gli scopi dello specifico monitoraggio da eseguire, il Soggetto gestore potrà prevedere altri metodi di campionamento o indagine, seguendo gli standard riconosciuti dalla comunità scientifica. Altresì, potranno essere impiegate metodologie sperimentali per cercare nuovi approcci di monitoraggio più efficienti. Rientrano in questi casi anche i monitoraggi di parametri ambientali abiotici e biotici relativi a porzioni di territorio che costituiscono habitat di specie e/o comunità vegetali.

Valutazione del ruolo delle ZPS quali aree per la sosta di popolazioni migratrici e svernanti abituali, comprese le specie di all. I della Direttiva Uccelli, non nidificanti in Regione Campania.

Regime autorizzativo

Le azioni di monitoraggio previste in questo programma devono essere autorizzate secondo le norme vigenti in base ai casi specifici, in particolare tutte le azioni che richiedono cattura o raccolta di esemplari.

Ai fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii. le azioni di monitoraggio previste da questo programma, eseguite da soggetti incaricati dalla Regione Campania o dai soggetti gestori per quanto di loro competenza, sono dichiarate direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti della Rete Natura 2000. A tal fine sono assimilate le azioni eseguite ai fini della redazione di Studi di Incidenza e del monitoraggio ex-ante, durante ed ex- post di Programmi/Piani/Progetti/Azioni/Interventi in siti Natura 2000 purché eseguiti con le metodologie descritte nel presente documento e i cui risultati vengano trasmessi agli uffici della Regione Campania competenti per la Rete Natura 2000 al fine della loro integrazione con il database della biodiversità Natura 2000.

MANUALE TECNICO PER IL CAMPIONAMENTO

Introduzione

I protocolli metodologici descritti in questa parte del Piano si riferiscono alle azioni di monitoraggio cui è stata attribuita maggiore importanza secondo quanto stabilito in *Strategie di monitoraggio*; riguardano quindi gli Habitat e le specie di all. I e II della Direttiva Habitat, oltre che le popolazioni nidificanti di all. I della Direttiva Uccelli, elencati nei Formulare Standard dei Siti Natura 2000 della Regione Campania.

In accordo a quanto previsto nelle *Strategie* in relazione alle azioni di minore importanza, i protocolli di campionamento prevedono che, durante il campionamento degli Habitat e delle specie su indicate, si provveda alla raccolta di dati relativi a Habitat e popolazioni di alcune specie di all. II Direttiva Habitat e nidificanti di all. I Direttiva Uccelli che per mancanza di conoscenze non sono segnalati nei Formulare ma potrebbero essere presenti nei Siti ed infine per le popolazioni di specie incluse negli all. IV e V della Direttiva Habitat.

Le metodologie e i protocolli di campionamento seguono le indicazioni dei Manuali per il monitoraggio di specie e Habitat di interesse comunitario (Direttiva Habitat) in Italia (Angelini *et al.* 2016, Ercole *et al.* 2016, Stoch e Genovesi 2016), opportunamente adattate per essere coerenti con i criteri di fattibilità indicati in *Strategie di monitoraggio*. Per gli uccelli, non trattati nei manuali citati, si sono seguite le metodologie standard riconosciute dalla comunità scientifica.

Per ogni componente (Habitat, specie vegetali, specie animali) vengono fornite indicazioni sui metodi da seguire nella realizzazione del monitoraggio, ovvero nelle attività di redazione delle cartografie e dei campionamenti e nella valutazione dello stato di conservazione per ogni Habitat/specie. Indicazioni di dettaglio per ogni tipo di Habitat e per ogni specie vengono poi fornite nelle Schede metodologiche Habitat/specie-specifiche.

Di seguito vengono riportate le indicazioni valide per tutte le componenti.

Cartografie e campionamenti

Il Sistema di Riferimento utilizzato nell'attuazione del Piano di Monitoraggio, sia in fase di raccolta dati che in fase di elaborazione, è il sistema UTM33N, Datum WGS84, corrispondente al codice EPSG 32633.

Durante la scelta delle unità di campionamento, è indicata l'esigenza di realizzare uno schema che garantisca la ricerca in maniera uniforme nelle maglie della griglia di 1 km di lato del reticolato standard europeo con sistema di proiezione LAEA 5210-ETRS89 (EPSG 3035), resa disponibile dalla Regione Campania nella sua proiezione nel Sistema di Riferimento utilizzato, affinché i risultati possano essere utilizzati anche per la raccolta delle informazioni per il Rapporto sesquennale ai sensi dell'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 Direttiva Uccelli.

Nelle attività di monitoraggio i Siti vengono organizzati in raggruppamenti definiti in base a considerazione di omogeneità territoriale, al fine di ottimizzare le indagini di campo in termini di tempo e risorse economiche. Ogni raggruppamento è individuato da un codice, citato nei protocolli di campionamento e per l'archiviazione dei dati.

Codici dei raggruppamenti di Siti

GRUPPO	CODICE SITO	TIPO SITO	DENOMINAZIONE SITO
AMPBA	IT8030040	B	Fondali Marini di Baia
AMPGA	IT8030041	B	Fondali Marini di Gaiola e Nisida
AMPNE	IT8030010	C	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
AMPNE	IT8030011	C	Fondali marini di Punta Campanella e Capri
AMPPC	IT8030027	B	Scoglio del Vervece
AMPPC	IT8050018	B	Isolotti Li Galli
AMPPI	IT8050037	C	Parco marino di Punta degli Infreschi
AMPSM	IT8050036	C	Parco marino di S. Maria di Castellabate
PCALB	IT8050033	B	Monti Alburni
PCALB	IT8050055	A	Alburni
PCBUL	IT8050023	B	Monte Bulgheria
PCCAM	IT8050011	B	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta
PCCAM	IT8050040	B	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta
PCCAM	IT8050047	A	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino

GRUPPO	CODICE SITO	TIPO SITO	DENOMINAZIONE SITO
PCCAS	IT8050022	B	Montagne di Casalbuono
PCCER	IT8050006	B	Balze di Teggiano
PCCER	IT8050024	B	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino
PCCER	IT8050028	B	Monte Motola
PCCER	IT8050046	A	Monte Cervati e dintorni
PCCOS	IT8050026	B	Monte Licosa e dintorni
PCCOS	IT8050032	B	Monte Tresino e dintorni
PCCOS	IT8050042	B	Stazione a Genista cilentana di Ascea
PCCOS	IT8050048	A	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse
PCFIU	IT8050001	B	Alta Valle del Fiume Bussento
PCFIU	IT8050002	B	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)
PCFIU	IT8050007	B	Basso corso del Fiume Bussento
PCFIU	IT8050012	B	Fiume Alento
PCFIU	IT8050013	B	Fiume Mingardo
PCFIU	IT8050016	B	Grotta di Morigerati
PCPAL	IT8050008	C	Capo Palinuro
PCPAL	IT8050038	B	Pareti rocciose di Cala del Cefalo
PCPAL	IT8050039	B	Pineta di Sant'Iconio
PCPAL	IT8050041	B	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo
PCSAC	IT8050030	B	Monte Sacro e dintorni
PCSOP	IT8050031	B	Monte Soprano e Monte Vesole
PCSOP	IT8050050	B	Monte Sottano
PCSOP	IT8050053	A	Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano
PCSTE	IT8050025	B	Monte della Stella
PNVES	IT8030021	B	Monte Somma
PNVES	IT8030036	B	Vesuvio
PNVES	IT8030037	A	Vesuvio e Monte Somma
PRCFL	IT8030001	B	Aree umide del Cratere di Agnano
PRCFL	IT8030002	B	Capo Miseno
PRCFL	IT8030013	B	Isolotto di S. Martino e dintorni
PRCFL	IT8030014	C	Lago d'Averno
PRCFL	IT8030015	B	Lago del Fusaro
PRCFL	IT8030016	B	Lago di Lucrino
PRCFL	IT8030017	B	Lago di Miseno
PRCFL	IT8030019	B	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione
PRCFL	IT8030020	B	Monte Nuovo
PRCFL	IT8030023	B	Porto Paone di Nisida
PRCFL	IT8030032	B	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli
PRCME	IT8030003	B	Collina dei Camaldoli
PRGAR	IT8010019	B	Pineta della Foce del Garigliano
PRGAR	IT8010022	B	Vulcano di Roccamonfina
PRGAR	IT8010029	B	Fiume Garigliano
PRLAT	IT8030006	B	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano
PRLAT	IT8030008	B	Dorsale dei Monti Lattari
PRLAT	IT8050009	A	Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
PRLAT	IT8050045	A	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi

GRUPPO	CODICE SITO	TIPO SITO	DENOMINAZIONE SITO
PRLAT	IT8050051	B	Valloni della Costiera Amalfitana
PRLAT	IT8050054	B	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
PRMAT	IT8010013	B	Matese Casertano
PRMAT	IT8010026	A	Matese
PRMAT	IT8020009	B	Pendici meridionali del Monte Mutria
PRPAR	IT8040006	B	Dorsale dei Monti del Partenio
PRPIC	IT8040009	B	Monte Accelica
PRPIC	IT8040010	B	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco
PRPIC	IT8040011	B	Monte Terminio
PRPIC	IT8040012	B	Monte Tuoro
PRPIC	IT8040014	B	Piana del Dragone
PRPIC	IT8040021	A	Picentini
PRPIC	IT8050027	B	Monte Mai e Monte Monna
PRPIC	IT8050052	B	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia
PRTAB	IT8020007	B	Camposauro
PRTAB	IT8020008	B	Massiccio del Taburno
REGAF	IT8040003	B	Alta Valle del Fiume Ofanto
REGAF	IT8040007	C	Lago di Conza della Campania
REGAF	IT8040008	B	Lago di S. Pietro – Aquilaverde
REGAV	IT8040004	B	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta
REGAV	IT8040005	B	Bosco di Zampaglione (Calitri)
REGAV	IT8040013	B	Monti di Lauro
REGAV	IT8040017	B	Pietra Maula (Taurano, Visciano)
REGAV	IT8040018	B	Querceta dell'Incoronata (Nusco)
REGAV	IT8040020	B	Bosco di Montefusco Irpino
REGAV	IT8040022	A	Boschi e Sorgenti della Baronia
REGBN	IT8020001	B	Alta Valle del Fiume Tammaro
REGBN	IT8020004	B	Bosco di Castelfranco in Miscano
REGBN	IT8020006	C	Bosco di Castelvetere in Val Fortore
REGBN	IT8020014	B	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
REGBN	IT8020015	A	Invaso del Fiume Tammaro
REGBN	IT8020016	C	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore
REGCE	IT8010004	B	Bosco di S. Silvestro
REGCE	IT8010005	B	Catena di Monte Cesima
REGCE	IT8010006	B	Catena di Monte Maggiore
REGCE	IT8010016	B	Monte Tifata
REGCE	IT8010017	B	Monti di Mignano Montelungo
REGNA	IT8030005	B	Corpo centrale dell'Isola di Ischia
REGNA	IT8030022	B	Pinete dell'Isola di Ischia
REGNA	IT8030024	C	Punta Campanella
REGNA	IT8030026	B	Rupi costiere dell'isola d'Ischia
REGNA	IT8030034	B	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia
REGNA	IT8030038	C	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
REGNA	IT8030039	C	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
REGSA	IT8050019	B	Lago Cessuta e dintorni

GRUPPO	CODICE SITO	TIPO SITO	DENOMINAZIONE SITO
REGSA	IT8050020	C	Massiccio del Monte Eremita
REGSA	IT8050034	B	Monti della Maddalena
REGSA	IT8050056	C	Fiume Irno
REGVO	IT8010027	B	Fiumi Volturno e Calore Beneventano
REGVO	IT8010030	A	Le Mortine
RNAST	IT8030007	C	Cratere di Astroni
RNSEL	IT8050010	B	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele
RNSEL	IT8050021	A	Medio corso del Fiume Sele - Persano
RNSEL	IT8050049	B	Fiumi Tanagro e Sele
RNVIV	IT8030012	C	Isola di Vivara
RNVOL	IT8010010	B	Lago di Carinola
RNVOL	IT8010015	B	Monte Massico
RNVOL	IT8010018	A	Variconi
RNVOL	IT8010020	B	Pineta di Castelvolturmo
RNVOL	IT8010021	B	Pineta di Patria
RNVOL	IT8010028	B	Foce Volturno - Variconi
RNVOL	IT8030009	B	Foce di Licola
RNVOL	IT8030018	B	Lago di Patria

Valutazione dello stato di conservazione

Il monitoraggio considera più di una sola variabile e si svolge a diverse scale spaziali: la scala di paesaggio e la scala di comunità. Variabili quali la superficie totale occupata da un Habitat o l'areale di una specie all'interno del Sito si riferiscono, ad esempio, alla scala di paesaggio, mentre la presenza di specie indicatrici, minacce e/o pressioni sono variabili utili alla scala di comunità. Non tutte le variabili considerate rappresentano direttamente degli indicatori; questi derivano dalla loro successiva elaborazione. Per chiarezza in questo Piano i termini *parametro* ed *indicatore (indice)* vengono utilizzati con i seguenti significati:

parametro (o dato grezzo): variabile nominale o numerica grezza valutata direttamente (in campo o in laboratorio) grazie all'analisi di una carta tematica (per la scala di paesaggio, ad esempio, perimetro e superficie di un poligono) oppure al momento del campionamento (per la scala di comunità, ad esempio, presenza o percentuale di copertura di una determinata specie)

indicatore: variabile nominale o numerica utilizzata per valutare lo stato di conservazione dell'Habitat/specie vegetale/specie animale; il confronto dei valori di questi indicatori calcolati per anni differenti fornisce l'entità delle variazioni. In alcuni casi l'indicatore è rappresentato direttamente da un parametro riferito al sito (ad esempio la superficie totale occupata dall'Habitat/specie vegetale /specie animale nel Sito), oppure è costituito da una variabile derivata dall'elaborazione di una o più parametri.

Schede metodologiche

Per ciascun Habitat/specie vegetale/specie animale considerata è predisposta una scheda in cui si forniscono tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente il campionamento sul territorio. In particolare, ogni scheda è composta dai seguenti campi:

Note: caratteristiche particolari dell'Habitat/specie vegetale /specie animale da tenere in considerazione al momento della pianificazione ed attuazione della attività di campo.

Metodo di campionamento: indicazioni circa la definizione dell'unità di campionamento su cui lavorare, tipo di rilievo da effettuare, forma e dimensioni dell'unità di campionamento.

Periodo di campionamento: periodo dell'anno in cui effettuare i campionamenti

Sforzo della sessione di monitoraggio: indicazioni circa il numero minimo di unità di campionamento ed eventuale ripetizione nel corso della sessione di monitoraggio

Stima della dimensione della popolazione (solo per specie vegetali/specie animali): indicazioni metodologiche per il rilevamento della consistenza della popolazione attraverso conteggi o stime.

Impegno umano: indicazioni circa le professionalità da coinvolgere e le giornate/uomo necessarie per svolgere le singole attività (pianificazione, campo, laboratorio)

Frequenza del monitoraggio: intervallo di tempo che deve trascorrere tra una sessione di monitoraggio e l'altra ai fini della valutazione delle variazioni

Campionamento degli Habitat

Carta di distribuzione e campionamenti

A scala di paesaggio il monitoraggio si basa sul confronto diacronico (e quindi sull'evoluzione nel tempo) di parametri ed indicatori numerici ottenuti a partire da carte tematiche realizzate in anni differenti preferibilmente ad intervalli regolari. Condizione essenziale è quindi che siano disponibili o vengano realizzati documenti cartografici in cui le tipologie rappresentate (voci di legenda) risultino utili ai fini del riconoscimento univoco degli Habitat e che rappresentino la loro distribuzione spaziale all'interno del Sito.

Sono quindi da considerarsi non utilizzabili le cartografie che riportino in legenda voci generiche e non ascrivibili con certezza ai tipi di Habitat.

Pur esistendo una vasta letteratura specialistica e scientifica relativa ai metodi da utilizzare per realizzare carte della vegetazione e più in particolare carte degli Habitat, di seguito vengono indicate alcune specifiche tecniche da applicare nello svolgimento del lavoro. In particolare, si ricorda che l'attività di campo, coerentemente con quanto definito nelle *Strategie di monitoraggio*, è finalizzata alla raccolta di parametri utili non solo alla validazione della bozza della carta ottenuta tramite fotorestituzione, ma anche alla realizzazione del monitoraggio attraverso il confronto con il "punto zero", costituito dalla carta degli habitat realizzata nel periodo 2021-2023.

Foto restituzione ed Unità Minima Cartografabile

Un parametro critico di cui tenere conto è la superficie dell'Unità Minima Cartografabile (e non solamente di rappresentazione), da ora in poi UMC: questa deve essere coerente con le esigenze di rappresentazione delle superfici e delle caratteristiche geometriche dei singoli poligoni (soprattutto ai fini di una quantificazione numerica di alcuni parametri), ma anche per le esigenze di monitoraggio e pertanto per la valutazione di eventuali variazioni nel tempo.

Con queste premesse e considerate le differenze esistenti tra le diverse tipologie di Habitat, è necessario prevedere diversi valori di UMC. Per la maggior parte di Habitat si raccomanda di utilizzare una UMC pari a 1000 m². Fanno eccezione solamente alcuni Habitat che vengono riportati nella tabella seguente.

Poiché alcuni Habitat, per loro stessa natura, occupano superfici di dimensioni ridotte, la loro rappresentazione areale potrebbe risultare difficile se non impossibile. In questi casi possono essere utilizzate primitive geografiche di tipo lineare o puntuale su una cartografia che mantenga la scala di rappresentazione delle altre tipologie. In questo caso l'area occupata stimata dovrà essere aggiunta come attributo all'elemento cartografico disegnato in cartografia. Nel caso di tipologie di Habitat la cui UMC è di 1000 m², le primitive di tipo lineare sono ammesse per poligoni di forma allungata la cui larghezza risulta mediamente inferiore a 20 m; i valori della larghezza media ammissibile per gli Habitat con UMC minore di 1000 mq sono riportati nella tabella seguente.

Tipi di Habitat che rappresentano casi particolari in termini di foto restituzione; per ogni Habitat viene indicata sia l'UMC che il valore soglia di larghezza media per l'utilizzo di primitive lineari.

Codice Habitat	Denominazione Habitat	UMC (m ²)	Larghezza poligono inferiore a (m)
1150	* Lagune costiere	400	10
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	200	5
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	400	10
1310	Vegetazione pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose	400	10
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	400	10
2110	Dune mobili embrionali	200	5
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	200	5

Codice Habitat	Denominazione Habitat	UMC (m ²)	Larghezza poligono inferiore a (m)
2210	Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae	200	5
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	200	5
2240	Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	200	5
2250	* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.	200	5
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia	200	5
2270	* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	200	5

Pianificazione attività di campo

Sulla base della Bozza della carta degli Habitat, si definiscono la frequenza e la distribuzione spaziale dei punti di controllo-campionamento. In particolare, dovranno essere indicate sulla carta:

le tessere oggetto di indagine,

il numero e la distribuzione dei punti di campionamento.

Per ognuno dei tipi di Habitat presenti all'interno del Sito i campionamenti dovranno essere effettuati all'interno di plot (o unità di campionamento) posizionati all'interno delle tessere (o poligoni) che nella bozza della carta individuano la distribuzione di quella tipologia sul territorio (nel caso di tipologie la cui rappresentazione cartografica possa essere areale) oppure nel punto o lungo la linea che ne segnala la presenza.

Il numero minimo dei rilievi (frequenza) per le fasi di controllo a terra sono dipendenti dall'Habitat da verificare e dalla sua superficie all'interno del Sito. Indicazioni specifiche in tal senso vengono riportate nelle Schede di rilevamento Habitat-specifiche alla voce *Sforzo di campionamento*.

La distribuzione delle unità di campionamento (così come definite nel glossario) dovrà essere fatta tenendo conto principalmente del reticolato con maglia 10x10 Km e del reticolato con maglia di 1x1 Km (che saranno resi reperibili dalla Regione Campania) che rappresentano le griglie ufficialmente utilizzate ai fini del rapporto ai sensi dell'art. 17 Direttiva Habitat. Per la precisione, i punti di campionamento dovranno essere:

equamente distribuiti all'interno del Sito tra i quadrati di 1x1 Km che intersecano il poligono della tipologia di riferimento

distribuiti all'interno del Sito in maniera da avere almeno 1 rilievo per quadrato di 1x1 Km

Per garantire una migliore significatività statistica del monitoraggio, per ognuno degli Habitat presenti in un Sito, i plot dovranno essere equamente distribuiti in un numero di tessere relative all'Habitat differenti, secondo lo schema seguente:

per un numero di tessere nel Sito < 5: tutte le tessere

per un numero di tessere >5 e < 20: 5 tessere + 1 tessera per ogni 3 tessere eccedenti le 5 o frazione di esse (es. 8 tessere: 5 + 1; 15 tessere: 5+4)

per un numero di tessere > 20: 10 tessere + 1 tessera per ogni 10 tessere eccedenti le 10 o frazione di esse (es. 28 tessere: 10 + 1; 114 tessere: 10+10))

I plot dovranno essere corrispondenti a quelli già utilizzati per il monitoraggio negli anni 2021-2023; tuttavia, qualora questi siano in numero inferiore a quanto descritto in precedenza, dovranno essere integrati affinché il campionamento sia sufficiente e rappresentativo.

Verifiche in campo e campionamenti

In questa fase vengono condotte sul territorio le attività di campionamento dei parametri previste nella fase di pianificazione utilizzando i protocolli indicati nelle schede di campionamento Habitat-specifiche. Il campionamento avverrà all'interno di ogni unità di campionamento ed è finalizzato ad ottenere:

validazione quali-quantitativa di quanto descritto nella Carta degli Habitat realizzata in precedenza, ai fini di una sua correzione e redazione della versione aggiornata

individuazione ed istituzione di plot permanenti integrativi a quelli utilizzati in precedenza

rilievi floristico-vegetazionali ed ambientali all'interno di tutti i plot

valutazione di pressioni e minacce

Tutti i parametri saranno archiviati nella banca dati Natura 2000 della Regione Campania

In campo ogni plot dovrà essere localizzato con un picchetto metallico o di altro materiale durevole, posto al suo centro (o in altra maniera se di forma differente), infisso profondamente nel suolo e sporgente per 10 cm circa con la testa di colore rosso o altri permanenti; questo per rendere il plot individuabile successivamente e permettere le attività di monitoraggio future.

La posizione del centro del plot sarà registrata tramite GPS. La georeferenziazione dovrà essere fatta utilizzando le seguenti specifiche: UTM fuso33 - WGS84 (EPSG 32633).

Per la stessa natura dei tipi di Habitat, le tecniche necessarie per la loro identificazione presuppongono la realizzazione di rilievi floristico-vegetazionali secondo il metodo fitosociologico classico (Braun-Blanquet 1964). L'attività di campo pertanto prevede la realizzazione di rilievi floristico-vegetazionali utilizzando la scheda allegata. In particolare devono essere registrati i principali caratteri abiotici del plot (quota, esposizione, tipologia di substrato, inclinazione), i caratteri strutturali della comunità vegetale (tipo di vegetazione utilizzando la legenda Corine Land Cover IV livello, stima dell'altezza media e dei valori di copertura dei differenti strati di vegetazione) ed infine l'elenco delle specie presenti e, per ognuna di esse, i valori di copertura utilizzando la scala di Braun-Blanquet modificata da Westhoff e Van der Maarel (1978). Infine, nella stessa scheda dovranno essere annotati gli eventuali fattori di pressione o minaccia secondo la codifica ufficiale prevista dalla UE disponibile sul portale www.naturacampania.it.

Al fine della gestione ed analisi dei dati raccolti nella fase di campo valgono le indicazioni di carattere generale riportate di seguito. I dati dei rilievi floristico-vegetazionali saranno utilizzati per la valutazione sintassonomica della comunità vegetale per verificare l'eventuale attribuzione ad un tipo di Habitat, secondo quanto riportato in Gigante *et al.* (2016)

La nomenclatura delle entità censite nel corso dei rilievi floristico-vegetazionali seguirà lo schema tassonomico e nomenclaturale proposto in Bartolucci *et al.* (2018) e Galasso *et al.* (2018). La raccolta di campioni d'erbario delle entità rilevate nel corso dei rilievi è fortemente raccomandata; diventa obbligatoria, invece, nel caso di entità, autoctone o esotiche, il cui dato di presenza rappresenti una novità rispetto al dato distributivo per la regione Campania secondo Bartolucci *et al.* (2018) e Galasso *et al.* (2018), ovvero entità riportate come dubbie, non segnalate o non confermate. I campioni d'erbario dovranno essere preparati secondo quanto descritto in Amedei (2012). Nello stesso modo dovranno essere raccolti individui rappresentativi delle entità riportate come critiche dal punto di vista tassonomico in Bartolucci *et al.* (2018) oppure afferenti al genere *Festuca* e *Hieracium*.

Il materiale d'erbario al termine del servizio dovrà essere consegnato ad un Erbario pubblico italiano (Moggi 2012). Nel caso di entità elencate nella L.R. 40/94 o negli all. IV e V di Direttiva Habitat la raccolta dovrà essere evitata (ad eccezione dei casi in cui essa sia indispensabile per una corretta determinazione) e sostituita da documentazione fotografica idonea ad evidenziare i caratteri discriminanti delle entità.

Tutta la documentazione fotografica, sia quella relativa alla documentazione delle stazioni che quella delle specie rilevate, dovrà essere consegnata, organizzata in cartelle contrassegnate dal codice univoco del rilevamento utilizzato nell'archiviazione dei dati.

Tutte le schede di campionamento saranno identificate da un codice univoco di 12 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei Siti seguito dalle ultime due cifre del codice del Sito Natura 2000 oggetto dei rilevamenti, dalla sigla "H", da un numero progressivo di quattro cifre (ad esempio: PRPIC11H0001, ovvero rilievo numero 1 tra quelli relativi agli Habitat nel territorio del raggruppamento di Siti PRPIC, nel Sito di codice IT8040011).

Valutazione dello stato di conservazione

In accordo con i diversi Manuali già citati, i parametri (talvolta indicati come *indicatori*) da rilevare e da utilizzare nel monitoraggio degli Habitat devono fornire indicazioni relativamente alle variazioni nel tempo di:

- area di copertura dell'Habitat,
- struttura e funzioni dell'Habitat

I parametri di struttura e funzione sono quelli individuati nel documento tecnico "Indicazioni operative per la compilazione della sezione 2 - obiettivi, attributi e target del format obiettivi e misure di conservazione", realizzato nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" - linea L1 "Gestione dei siti della Rete Natura 2000", disponibili sul portale www.naturacampania.it.

Schede metodologiche per gli Habitat

Di seguito sono riportate le schede di rilevamento specifiche per ogni Habitat o gruppi di Habitat; in queste schede sono indicate le metodologie da utilizzare per la definizione dei parametri utili alla quantificazione dello stato di conservazione degli Habitat e da monitorare nel tempo.

Le schede seguono lo schema generale previsto; in particolare, alla voce *Impegno umano*, si forniscono indicazioni circa le professionalità da coinvolgere e le giornate/uomo necessarie per svolgere le singole attività che sono distinte in:

pianificazione delle attività: sono comprese con questo termine tutte le azioni preparatorie necessarie per programmare efficacemente le attività di campagna e le successive attività di analisi ed elaborazione dati; rientrano quindi tutte le attività inerenti la ricerca di documenti (bibliografia scientifica, documenti cartografici, documenti tecnico-scientifici, database informatici) utili a conoscere la distribuzione territoriale dell'oggetto del monitoraggio, ma anche la fase di individuazione delle stazioni in cui disporre le unità di campionamento da raggiungere e da campionare, la loro distribuzione, il loro numero, la quantificazione dei tempi e di tutte le possibili opzioni da considerare, in accordo a quanto indicato alle voci Metodo, Sforzo, Periodo e Frequenza del Campionamento.

attività di campo: sono comprese le vere e proprie attività di campionamento da svolgere sul territorio, così come indicato nei Metodi di campionamento. Per queste attività i tempi di svolgimento delle stesse sono stati calcolati al netto delle ore necessarie per raggiungere le località. La quantificazione dei tempi necessari per raggiungere le località dipende da numerosi fattori (dimensioni del Sito, presenza e qualità della viabilità, distribuzione spaziale delle superfici occupate da quell'Habitat) che non possono essere previsti con la dovuta accuratezza in maniera generica per tutti i Siti. Al momento della pianificazione delle attività sarà necessario quantificare in maniera separata le ore necessarie agli spostamenti.

attività di laboratorio: sono comprese le attività di laboratorio svolte su materiale biologico (riconoscimento e preparazione di campioni vegetali), ma anche l'attività di informatizzazione dei dati (popolamento della Banca Dati e/o fogli di lavoro elettronici), di analisi statistica, di elaborazione di documenti tecnico-scientifici.

Le metodologie sono riportate in schede separate, una per ogni Habitat o gruppi di Habitat se questi presentano una coerenza ecologica; in tal modo, per ciascun Sito è possibile pianificare le attività di monitoraggio consultando le sole schede relative agli Habitat la cui presenza è segnalata nel rispettivo Formulario.

1210 - *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*

2110 - *Dune embrionali mobili*

2120 - *Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)*

2210 - *Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)*

2230 - *Dune con prati dei *Malcolmietalia**

2240 - *Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua*

2250* - *Dune costiere con *Juniperus spp.**

2260 - *Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia**

Note: Nel caso degli Habitat sopra elencati si consiglia un campionamento di tipo sinergico, in cui i parametri vengono rilevati lungo lo stesso transetto perpendicolare alla costa secondo le tecniche indicate nel metodo di campionamento.

Metodo di campionamento: Ogni unità di campionamento è rappresentata da un transetto permanente lungo il quale saranno posizionati in maniera alternata i plot di rilevamento. Ogni transetto deve essere disposto in maniera perpendicolare alla linea di costa a partire dalla vegetazione legnosa più strutturata presente più lontana dalla linea di costa, fino ad arrivare alla porzione della spiaggia interessata dal moto ondoso priva di piante superiori (zona afitoica). La lunghezza del transetto dovrà essere registrata al momento del campionamento e sarà variabile in funzione delle caratteristiche locali e dello sviluppo della vegetazione. Il transetto dovrà essere di tipo permanente e pertanto il punto di inizio e di fine dello stesso transetto dovrà essere georiferito tramite l'uso di un GPS. Lungo il transetto saranno disposti i plot a distanza di due metri lineari l'uno dall'altro. Ogni plot quadrato dovrà essere georiferito e le coordinate dovranno essere indicate nella scheda di rilevamento.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: quadrato di 1mq

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: nei Siti con sviluppo lineare della fascia di vegetazione comprendente almeno uno degli Habitat di questa scheda < 5km: 1 transetto perpendicolare alla linea di costa ogni x metri pari al 10% della lunghezza lineare della linea di costa con approssimazione al centinaio di metri (ad es.: lunghezza lineare = 1,64 Km= 1 transetto ogni 200 metri; lunghezza lineare = 4,34 Km= 1 transetto ogni 400 metri); nei Siti con sviluppo lineare della fascia di vegetazione comprendente almeno uno degli Habitat di questa scheda > 5km: 1 transetto perpendicolare alla linea di costa ogni 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da due unità di personale (un esperto senior ed uno junior); si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 3 transetti. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di tre giorni lavorativi per 10 transetti

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

Note: nel caso degli Habitat sopra elencati è possibile effettuare un campionamento di tipo sinergico, con evidente contenimento dei costi, nel caso sia accertata la presenza nella stessa area geografica dell'Habitat 8210 e/o di specie di rilevante valore biogeografico o protezionistico. In tal caso lo stesso personale impegnato nel campionamento dell'Habitat può anche effettuare il campionamento per le specie, in accordo alle rispettive tecniche di monitoraggio riportate in *Campionamento delle specie vegetali*. Poiché questo Habitat può essere presente anche su coste rocciose non praticabili a piedi, il monitoraggio prevede anche una metodica speditiva per il rilevamento da una imbarcazione che si muove lungo la costa (campionamento dalla barca).

Metodo di campionamento: nel caso di campionamento a terra, ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dove possibile si consiglia la marcatura del centro per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio. Nel caso di tratti di costa impervi non praticabili, il monitoraggio può essere svolto dalla barca effettuando un *visual census* con l'aiuto di un binocolo; in questi casi non si può parlare di plot permanenti, ma viene rilevato un tratto di costa che si trova di fronte alla barca di cui è necessario georiferire la posizione.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: nel caso di rilievo a terra cerchio di 2.5m di raggio; per il rilievo dal mare un tratto di costa di circa 100 mq

Periodo del campionamento: marzo-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: campionamento a terra - nei Siti con sviluppo lineare della costa ospitante questo Habitat < 5km: 1 plot ogni Km della linea di costa; nei Siti con sviluppo lineare della costa > 5km: 1 plot ogni 3 Km. Campionamento dalla barca: 1 ogni 2 Km

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: nel caso di stazioni di presenza raggiungibili a piedi, l'attività può essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. In caso di campionamento dalla barca si prevede la presenza di 1 esperto senior accompagnato da personale non qualificato che conduce l'imbarcazione; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per la realizzazione di 15 campionamenti. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di tre giorni lavorativi per 20 plot; per un numero di plot > 20, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)

Note: nel caso degli Habitat sopra elencati, poiché spesso si ritrovano negli stessi luoghi a poca distanza tra loro, si consiglia un campionamento di tipo sinergico, in cui i parametri relativi ad essi vengono rilevati nella stessa giornata in cui si svolgono le attività di campo, con evidenti risparmi economici. Questa considerazione potrebbe essere estesa anche ai seguenti Habitat (1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) e 1510*: Steppe salate mediterranee (Limonicetalia), non ancora segnalati per la Campania, ma la cui presenza è altamente probabile nello stesso Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 1.5m di raggio

Periodo del campionamento: luglio-settembre

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/ha di superficie occupata dall'Habitat

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di tre giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

2250 - Dune costiere con Juniperus spp.*

Note: Questa attività si aggiunge a quella prevista per lo stesso Habitat fatta su transetto perpendicolare alla costa; l'attività può essere svolta in sinergia con quella dei transetti lineari perpendicolari alla linea di costa.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/ha di superficie occupata dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 20 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

Note: Questa attività si aggiunge a quella per lo stesso Habitat fatta su transetto perpendicolare alla costa; l'attività può essere svolta in sinergia con quella dei transetti lineari perpendicolari alla linea di costa.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2m di raggio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/ha di superficie occupata dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 20 metri di distanza l'uno dall'altro

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

2270: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*

Note: Questa attività si aggiunge a quella relativa agli altri Habitat di coste sabbiose fatta su transetto perpendicolare alla costa; l'attività può essere svolta in sinergia con quella dei transetti lineari perpendicolari alla linea di costa.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico e conteggio individui arborei con altezza <3m

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: per il rilievo fitosociologico 1 plot/5ha superficie occupata dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Nel 50% dei plot utilizzati per il rilievo fitosociologico, conteggio del numero di individui di specie arboree sul 50% della superficie del plot.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: rilievo fitosociologico l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 6 plot. N.B. si ricorda che nella pianificazione delle attività deve essere considerato anche il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: rilievo fitosociologico una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

3130: Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot è necessario registrarne la posizione per permettere di effettuare i campionamenti delle successive sessioni di monitoraggio nelle sue vicinanze.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 0.6 m di raggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/corpo d'acqua; i plot dovranno essere disposti ad almeno 20 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

3140: Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot è necessario registrarne la posizione per permettere di effettuare i campionamenti delle successive sessioni di monitoraggio nelle sue vicinanze.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 0.6 m di raggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/corpo d'acqua; i plot dovranno essere disposti ad almeno 20 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot è necessario registrarne la posizione per permettere di effettuare i campionamenti delle successive sessioni di monitoraggio nelle sue vicinanze.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 0.6 m di raggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/corpo d'acqua; i plot dovranno essere disposti ad almeno 20 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

*3170 *: Stagni temporanei mediterranei*

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot è necessario registrarne la posizione per permettere di effettuare i campionamenti delle successive sessioni di monitoraggio nelle sue vicinanze.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 0.6 m di raggio

Periodo del campionamento: febbraio - maggio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 5 plot/corpo d'acqua; i plot dovranno essere disposti ad almeno 20 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5 m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 2 plot/Km lineare di asta fluviale con aree occupate dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Lo schema di campionamento può subire modifiche a causa di condizioni ambientali riscontrate in campo che rendano impossibile la sua attuazione; in questo caso dovranno essere dichiarate le cause e specificato il nuovo schema di monitoraggio

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

*3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche- Batrachion**

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot è necessario registrarne la posizione per permettere di effettuare i campionamenti delle successive sessioni di monitoraggio nelle sue vicinanze.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 1.5 m di raggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 2 plot/Km lineare di asta fluviale con aree occupate dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Lo schema di campionamento può subire modifiche a causa delle reali condizioni ambientali trovate sul territorio che rendano impossibile la sua attuazione; in questo caso dovrà essere specificato dettagliatamente il motivo/in questo caso dovranno essere dichiarate le cause e specificato il nuovo schema di monitoraggio

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

*3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p.*

Note: Habitat spesso costituita da una fascia di vegetazione con lunghezza cartografabile, ma larghezza solitamente di ridotte dimensioni, non rappresentabile. La rappresentazione cartografica può avvenire tramite l'utilizzo di una primitiva di tipo lineare a cui associare come attributo la larghezza media stimata della superficie occupata dall'Habitat.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 1.5 m di raggio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 2 plot/Km lineare di asta fluviale con aree occupate dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Lo schema di campionamento può subire modifiche a causa delle reali condizioni ambientali trovate sul territorio che rendano impossibile la sua attuazione; in questo caso dovranno essere dichiarate le cause e specificato il nuovo schema di monitoraggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

Note: Habitat spesso presente su superfici difficilmente cartografabili; può essere rappresentata da una fascia di vegetazione con lunghezza cartografabile, ma larghezza solitamente di ridotte dimensioni, non cartografabile. La rappresentazione cartografica può avvenire tramite l'utilizzo di una primitiva di tipo lineare a cui associare come attributo la larghezza media stimata della superficie occupata dall'Habitat.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5 m di raggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 2 plot/Km lineare di asta fluviale con aree occupate dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Lo schema di campionamento può subire modifiche a causa delle reali condizioni ambientali trovate sul territorio che rendano impossibile la sua attuazione; in questo caso dovranno essere dichiarate le cause e specificato il nuovo schema di monitoraggio

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di due giorni lavorativi per 10 plot; per un numero di plot > 10, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni tre anni

*5130: Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli*

Note: Considerata la notevole variabilità in estensione che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 4m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/2ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 5 plot + 1plot per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 5 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 14 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 14 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 14 + 26 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp.

Note: Considerata la notevole variabilità in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 4m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/2ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 5 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 5 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 10 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 10 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 10 + 11 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

5320: Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

Note: Considerata la notevole variabilità in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 3m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1 plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 5ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 5ha allora 5 plot + 1 plot /3ha per ogni ettaro eccedente o frazione di esso (es. se sup. totale = 7.4 ha allora 5 + 1 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 4m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/2ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 5 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 5 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 10 plot + 1plot; per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 10 + 1 plot; se sup. totale = 618.4 ha allora 10 + 11 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

6110: Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi*

Note: Habitat spesso presente su superfici difficilmente cartografabili perché di ridotte estensioni; la rappresentazione cartografica può avvenire tramite l'utilizzo di una primitiva di tipo puntuale a cui associare come attributo la superficie in mq occupata dall'Habitat in una determinata stazione.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 1m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 2 plot per ogni stazione di presenza fino ad un massimo di 10 stazioni per ogni Sito. La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 20 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot; tale valore può aumentare se le stazioni di presenza dell'Habitat sono molto distanti tra loro. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 15 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 15 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 15 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

*6210pf: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito. In questo tipo di Habitat, presente come *Priority Form* (pf), il monitoraggio deve essere integrato dal monitoraggio interno al plot circolare, descritto nel paragrafo seguente, seguendo le modalità illustrate nella scheda della pagina seguente.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 19 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 19 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 19 + 26 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

*6210pf: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)*

Note: Considerato che la forma prioritaria, in accordo a quanto riportato nel, Manuale Italiano per l'Interpretazione degli Habitat (Biondi & Blasi, 2011) deriva dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- (a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;
- (b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;
- (c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.

Per questo Habitat si prevede un ulteriore monitoraggio indirizzato alla quantificazione dello stato di conservazione delle popolazioni di orchidee presenti nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da 4 plot quadrati all'interno dello stesso plot circolare permanente utilizzato per il rilievo fitosociologico (1 plot al centro di ognuno dei 4 quadranti del plot circolare).

Tipo di rilievo: conteggio numerico di tutti gli individui di ognuna delle specie di Orchidacee presenti nei quattro plot. Il numero di individui dovrà essere annotato per ogni specie nella scheda di rilevamento.

Forma e dimensioni del plot: quadrato di 1x1 m

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1 unità di campionamento (4plot) ogni 2 plot circolari permanenti, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 5 unità di campionamento + 1 unità ogni 6 plot circolari permanenti eccedenti o frazioni di esso; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 20 unità di campionamento + 1 unità di campionamento ogni 15 plot circolari permanenti. La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 2 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 unità di campionamento (4 quadrati); N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 unità di campionamento; per un numero di unità di campionamento > 5 e fino a 50 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 unità o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

6220*: *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: marzo-maggio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 15 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 15 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 15 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

6230*: *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 15 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 15 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 15 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

Note: Habitat spesso presente su superfici difficilmente cartografabili può essere rappresentata da una fascia di vegetazione con lunghezza cartografabile, ma larghezza solitamente di ridotte dimensioni, non cartografabile. La rappresentazione cartografica può avvenire tramite l'utilizzo di una primitiva di tipo lineare a cui associare come attributo la larghezza media stimata della superficie occupata dall'Habitat.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1 plot/400m di lunghezza della fascia dall'Habitat; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 8 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 8 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 40 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

6510: *Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio. Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 15 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 15 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 15 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

7220: Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)*

Note: Habitat spesso presente su superfici difficilmente cartografabili perché di ridotte estensioni e su superfici generalmente a forte pendenza; la rappresentazione cartografica può avvenire tramite l'utilizzo di una primitiva di tipo puntuale a cui associare come attributo la dimensione stimata della superficie occupata dall'Habitat. Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da due plot circolari permanenti; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 0.5m di raggio

Periodo del campionamento: marzo-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1 unità di campionamento (2 plot) per ogni stazione di presenza dell'Habitat nel caso siano segnalati nel Sito fino a 10 stazioni di presenza; per un numero di stazioni di presenza superiori a 10, allora 10 unità di campionamento + 1 unità di campionamento ogni 10 stazioni o frazioni di 10. La distanza tra le stazioni non deve essere inferiore ai 400 metri; i plot dovranno essere disposti ad almeno 100 metri di distanza l'uno dall'altro

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione briofitica

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 unità di campionamento. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 40 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio. Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 15 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 15 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 15 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio. Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 2.5m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 17.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 15 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 15 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 15 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Note: Habitat spesso presente su superfici difficilmente cartografabili perché su versanti generalmente a forte pendenza; interessa sia costoni in aree montuose, ma anche numerosi tratti di costa rocciosa con pareti verticali o subverticali; la rappresentazione cartografica può avvenire tramite l'utilizzo di una primitiva di tipo puntuale o di tipo lineare cui associare come attributo la dimensione stimata della superficie occupata dall'Habitat, riferendosi in questo caso non alla proiezione, ma alla superficie reale. Per questo Habitat è possibile effettuare un campionamento di tipo sinergico con evidente contenimento dei costi, nel caso di rupi costiere dove sia accertata la presenza nella stessa area geografica dell'Habitat 1240 e/o di specie di elevato valore biogeografico o protezionistico. In tal caso lo stesso personale impegnato nel campionamento dell'Habitat può anche effettuare il campionamento per le specie, in accordo alle rispettive tecniche di monitoraggio. Poiché questo Habitat può essere presente anche su coste rocciose non praticabili a piedi, il monitoraggio prevede anche una metodica speditiva per il rilevamento tramite utilizzo di rilievi fotografici effettuati da terra e/o da una imbarcazione che si muove lungo la costa (campionamento dalla barca nel caso di falesie costiere). Considerata la notevole variabilità in termini di frequenza ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: nel caso di stazioni rilevabili direttamente in quanto raggiungibili, ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio. Nel caso di pareti rocciose con altezze superiori a 10 metri o nel caso di falesie costiere in cui non è possibile il rilievo a terra, il monitoraggio può essere svolto (da terra e/o dalla barca in funzione della tipologia di parete rocciosa) effettuando una serie di fotografie con Macchina fotografica digitale reflex con risoluzione minima di 21Mp ed ottica con lunghezza focale compresa tra 50-100 mm (raffrontato al pieno formato); in questi casi non si può parlare di plot permanenti, ma l'unità di campionamento è un tratto di parete che si trova di fronte alla macchina fotografica, la cui posizione deve essere georiferita tramite uso di GPS; nel caso di fotografia effettuata dalla barca, sarà necessario disporre la barca di fronte alla falesia e georiferire la posizione della barca tramite GPS.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: nel caso di rilievo a terra cerchio di 2.5m di raggio. Per il rilievo di tipo fotografico, un tratto di parete di circa 100 metri lineari

Sforzo della sessione di monitoraggio: campionamento diretto: nei Siti con sviluppo lineare della costa ospitante questo Habitat < 5km: 1 plot ogni Km della linea di costa; nei Siti con sviluppo lineare della costa > 5km: 1 plot ogni 3 Km. Campionamento dalla barca: 1 unità di campionamento ogni Km di costa se non sono segnalate stazioni di specie di All. II; nel caso di presenza di specie di All. II 100 metri lineari ogni stazione di presenza di specie di All. II

Periodo del campionamento: il mese di aprile nel caso siano presenti stazioni di *Primula palinuri* su cui effettuare sinergicamente il campionamento, estensibile fino a giugno per i siti costieri in cui non è presente *P. palinuri*; giugno-agosto per quelli interni del piano montano.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: nel caso di stazioni di presenza raggiungibili a piedi, l'attività può essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. In caso di campionamento dalla barca, 1 esperto senior accompagnato da personale non qualificato che conduce l'imbarcazione; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per la realizzazione di 10 unità di campionamento comprensive di rilievo fotografico. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di tre giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

8310 : Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Note: nessuna

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da due plot circolari permanenti posti ai lati dell'ingresso della grotta; la posizione di ogni plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio.

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: 1 plot di 2.5 metri di diametro

Periodo del campionamento: Considerata la peculiarità di questa tipologia di habitat, le attività possono essere svolte durante tutto l'anno.

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/3 grotte presenti nel Sito.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 unità di campionamento. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 2 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 40 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 10 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

8320 : Campi di lava e cavità naturali

Note: In accordo a quanto riportato nel Manuale di monitoraggio redatto da ISPRA (Angelini *et al.* 2016), cui si rimanda per una completa descrizione e caratterizzazione, questo Habitat può essere presente con diversi sottotipi la cui definizione è necessaria ai fini della scelta della corretta metodologia di rilevamento; in Campania i sottotipi attualmente conosciuti sono i seguenti:

66.3 - Campi lavici recenti privi o con rada vegetazione vascolare

66.4 - Campi di ceneri e lapilli vulcanici

66.6* - Fumarole.

I sottotipi possono coesistere nello stesso Sito o anche essere presenti in maniera singola. Di seguito vengono distinte le tecniche di campionamento per ogni sottotipo. Considerata la notevole variabilità in termini di frequenza ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, per ogni sottotipo vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot:

66.3: cerchio di 0.25 m di raggio

66.4: cerchio di 2 m di raggio

66.6: cerchio di 0.5 m di raggio

Periodo del campionamento:

66.3: marzo-settembre

66.4: aprile-maggio

66.6: febbraio-novembre

Sforzo della sessione di monitoraggio:

66.3: 1 plot/2ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 5 plot + 1 plot/ha per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 12.4 ha allora 5 + 1 plot) nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 14 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 14 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 14 + 26 plot). fino ad un massimo di 50 plot/Sito La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

66.41: 1 plot/2ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 10ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 10ha e <100 allora 5 plot + 1 plot/ha per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 12.4 ha allora 5 + 1 plot) nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 14 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 107.4 ha allora 14 + 1 plot se sup. totale = 618.4 ha allora 14 + 26 plot). fino ad un massimo di 50 plot/Sito La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 200 metri.

66.6: 1 plot per fumarola se di tipo puntuale, fino ad un massimo di 10 plot per Sito

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione fanerogamica, ma soprattutto briofitica e lichenica.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; 66.3: si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 8 plot; 66.4: si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 10 plot; 66.6: si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot; tali valori possono aumentare se i luoghi di presenza dell'Habitat sono molto distanti tra loro. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 10.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9180: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo:

rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 6 m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/5ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha allora 20 plot + 1plot per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 20 + 2 plot) nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 110 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 110 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 110 + 31 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: rilievo fitosociologico l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

*91AA *: Boschi orientali di quercia bianca*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo:

rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10 m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100 ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100 ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di due giornate di lavoro.

Attività di campo: rilievo fitosociologico - l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: rilievo fitosociologico: 1plot/5ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha allora 20 plot + 1plot per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 20 + 2 plot) nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 110 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 110 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 110 + 31 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo:

rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di due giornate di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9220: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo:

rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di due giornate di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9260: Boschi di Castanea sativa

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/20ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 5 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 5 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 28 plot + 1plot per ogni 100 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 28 + 2 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 28 + 13 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: rilievo fitosociologico: 1plot/5ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha allora 20 plot + 1plot per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 20 + 2 plot) nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 110 plot + 1plot per ogni 40 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 110 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 110 + 31 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

92C0: Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo:

rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: rilievo fitosociologico: 1plot/5ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha allora 20 plot + 1plot per ogni 10 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 20 + 2 plot) nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 110 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 110 + 6 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 110 + 61 plot). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot; N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativo per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicate tre casi in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9530: Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici*

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo:

rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

Note: Considerata la notevole variabilità ed estensione in superficie che l'Habitat può presentare all'interno di ogni Sito, vengono indicati diversi sforzi di campionamento in funzione della superficie totale occupata dall'Habitat nel Sito.

Metodo di campionamento: ogni unità di campionamento è rappresentata da un plot circolare permanente; la posizione del plot viene georiferita attraverso la determinazione delle coordinate geografiche del centro del cerchio utilizzando un GPS. Dopo avere individuato il centro del plot, è necessario marcarlo con picchetto metallico o altro materiale durevole per permettere di ritrovare l'esatta posizione del plot nelle successive sessioni di monitoraggio

Tipo di rilievo: rilievo fitosociologico

Forma e dimensioni del plot: cerchio di 10m di raggio

Periodo del campionamento: aprile-giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio: 1plot/10ha di superficie occupata dall'Habitat, nel caso la superficie totale di presenza nel Sito < 100ha; nel caso la superficie totale nel Sito sia > 100ha e <1000 allora 10 plot + 1plot per ogni 20 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 117.4 ha allora 10 + 1 plot); nel caso la superficie totale nel Sito sia > 1000 ha allora 55 plot + 1plot per ogni 50 ettari eccedenti o frazione di esso (es. se sup. totale = 1107.4 ha allora 55 + 3 plot se sup. totale = 2218.4 ha allora 55 + 25 plot);). La distanza tra i plot non deve essere inferiore ai 500 metri.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Pianificazione delle attività: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro.

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 plot. N.B. a tali valori deve essere aggiunto il tempo necessario per raggiungere i luoghi di presenza dell'Habitat, anche nella stessa giornata.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 plot; per un numero di plot > 5 e fino a 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 plot o frazione di 5; per un numero di plot > 50 plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

Quadro riassuntivo della forma dell'unità di campionamento e del periodo in cui attuare il monitoraggio per tutti gli Habitat della Regione Campania

Habitat codice	Nome Habitat	Forma plot	MESE											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	quadrato				X	X	X						
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	cerchio				X	X	X	X					
1310	Vegetazione pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose	cerchio							X	X	X			
1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	cerchio							X	X	X			
2110	Dune mobili embrionali	quadrato				X	X	X						
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	quadrato				X	X	X						
2210	Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae	quadrato				X	X	X						
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	quadrato				X	X	X						
2240	Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	quadrato				X	X	X						
2250	* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.	quadrato				X	X	X						
2250	* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.	cerchio				X	X	X						
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia	quadrato				X	X	X						
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia	cerchio				X	X	X						
2270	* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	cerchio				X	X	X						
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea	quadrato					X	X	X					
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione benthica di <i>Chara</i> spp.	quadrato						X	X	X				
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	quadrato						X	X	X				
3170	* Stagni temporanei mediterranei	quadrato		X	X	X	X							

3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>	cerchio				X	X	X						
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	cerchio					X	X	X					
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidenton</i> p.p.	cerchio					X	X	X					
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	cerchio					X	X	X					
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	cerchio						X	X	X				
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.	cerchio				X	X	X						
5320	Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere	cerchio				X	X	X						
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	cerchio				X	X	X						
6110	* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi	cerchio				X	X	X						
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)	cerchio					X	X	X					
6210pf	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)(*notevole fioritura di orchidee)	cerchio					X	X	X					
6210pf	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)(*notevole fioritura di orchidee)	quadrato					X	X	X					
6220	* Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	cerchio			X	X	X							
6230	* Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)	cerchio						X	X	X				
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile.	cerchio						X	X	X				

6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	cerchio							X	X	X				
7220	* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)	quadrato			X	X	X	X	X	X	X				
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	cerchio							X	X	X				
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	cerchio							X	X	X				
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	cerchio				X	X	X	X	X	X				
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	cerchio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8320	Campi di lava e cavità naturali (Campi lavici recenti privi o con rada vegetazione vascolare)	cerchio			X	X	X	X	X	X	X	X			
8320	Campi di lava e cavità naturali (Campi di ceneri e lapilli vulcanici)	cerchio				X	X								
8320	Campi di lava e cavità naturali (Fumarole)	cerchio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9180	* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	cerchio				X	X	X							
91AA	*Boschi orientali di quercia bianca	cerchio				X	X	X							
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	cerchio				X	X	X							
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di Cerro e Rovere	cerchio					X	X	X						
9210	* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	cerchio					X	X	X						
9220	* Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>	cerchio					X	X	X						
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	cerchio				X	X	X							
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	cerchio				X	X	X							
92C0	Foreste di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	cerchio				X	X	X							
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	cerchio				X	X	X							

9530	* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici	cerchio				X	X	X						
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	cerchio				X	X	X						

Campionamento delle specie vegetali

In ciascun Sito, per ogni specie, il monitoraggio si compone delle seguenti azioni:

1. realizzazione della carta di distribuzione
2. valutazione dello stato di conservazione

Ad ogni sessione di monitoraggio, secondo la frequenza prevista nella scheda specie-specifica, si ripeteranno tutte le azioni su elencate.

Carte di distribuzione

Per ciascuna specie si dovrà realizzare una carta di distribuzione reale per punti, che prevede le fasi di lavoro descritte di seguito.

1. Pianificazione del lavoro di campo: Questa fase richiede un accurato studio delle caratteristiche morfologiche, biologiche ed ecologiche della specie, disponibili in Ercole *et al.* (2016) e una precisa conoscenza dell'areale di distribuzione regionale e dovranno essere integrate da eventuali ulteriori informazioni disponibili nella letteratura scientifica o presso i soggetti Gestori. Tutte le indicazioni disponibili dovranno essere valutate in modo critico per pianificare correttamente le indagini di campo in modo da comprendere tutta l'area potenzialmente interessata dalla presenza della specie.
2. Lavoro di campo: La cartografia viene realizzata in base a rilievi su campo finalizzati alla registrazione di tutte le stazioni di presenza della specie. I dati distributivi saranno rilevati tramite georeferenziazione di tutte le stazioni della specie con GPS. In caso di stazioni molto estese sarà necessario ripetere la registrazione dei punti di presenza degli individui ad una distanza minima di 10 m e registrare in particolare i limiti dell'area interessata. Nel caso di mancato rinvenimento della specie si provvederà comunque a registrare i punti visitati, per permettere un preciso confronto nelle sessioni di monitoraggio successive.
3. Lavoro di laboratorio: Le stazioni georiferite saranno salvate in formato shape, con le modalità descritte in *Conservazione e gestione dati*.

Le carte di distribuzione rappresentano la base fondamentale per la corretta pianificazione delle azioni di monitoraggio, come illustrato nelle schede specie-specifiche di questo documento.

Campionamenti

La stima dello stato di conservazione richiede una serie di attività da svolgersi in campo. Oltre a quelle già descritte per la realizzazione della cartografia delle specie, le attività necessarie al monitoraggio delle specie vegetali comprendono:

- Analisi demografica - permette di fornire indicazioni sullo stato vitale della specie nelle diverse stazioni di presenza e sulle eventuali variazioni. Prevede la stima del numero di individui, indicati come numero esatto, intervallo minimo-massimo o classe, così come previsto in Evans e Arvela (2011), e del numero di individui fioriti/fruttificati. Sarà registrata inoltre l'eventuale presenza di disseminazione e lo sviluppo di plantule (rilievo demografico).
- Analisi floristico-vegetazionale - permette di fornire dati grezzi utili alla descrizione dell'habitat della specie. Per ogni stazione (o plot) dovranno essere rilevati i principali dati abiotici (quota, esposizione, tipologia di substrato, inclinazione). L'analisi prevede l'annotazione della tipologia vegetazionale (legenda CLC 4 livello) o Habitat presente all'interno della stazione (o plot) e la realizzazione di un rilievo floristico-vegetazionale, che consentirà di valutare la presenza ed abbondanza di specie di interesse fitogeografico (endemiche, al limite del loro areale di distribuzione, incluse nella LR 40/94) e alloctone con particolare riferimento a quelle invasive, la presenza di specie indicatrici di processi dinamici (ad esempio presenza di specie legnose in ambienti di prateria) e/o la presenza di specie indicatrici di disturbo e/o antropizzazione (cosmopolite, nitrofile, impalatabili).
- Analisi pressioni/minacce - permette di evidenziare i fenomeni che possono aver danneggiato nel passato o danneggiare nel futuro le specie. Gli eventuali fattori di pressione o minaccia verranno registrati secondo la codifica ufficiale disponibile sul portale www.naturacampania.it.
- Documentazione fotografica - Le indagini di campo dovranno inoltre essere accompagnate da un'adeguata documentazione fotografica (rilievo fotografico) delle stazioni e delle entità di cui non è consentita la raccolta. In particolare, in caso di stazioni su rupi verticali, è richiesto l'utilizzo di macchina fotografica digitale reflex con risoluzione minima di 20Mp ed un campo visivo a pieno formato di non più di 20 metri.

Tutti i parametri grezzi rilevati (dati stazionali, dati fitosociologici, dati demografici, fattori di pressione/minaccia) e la indicazione di presenza di documentazione fotografica saranno registrati in campo, sulle apposite schede di campionamento allegate, per la successiva archiviazione nella banca dati Natura 2000 della Regione Campania.

Al fine della gestione ed analisi dei dati raccolti nella fase di campo valgono le indicazioni di carattere generale riportate di seguito. Per la tassonomia delle specie di Direttiva si fa riferimento all'elenco utilizzato per l'ultimo report ex art 17 disponibile sul portale www.naturacampania.it

La nomenclatura delle entità censite nel corso dei rilievi floristico-vegetazionali seguirà lo schema tassonomico e nomenclaturale proposto in Bartolucci *et al.* (2018) e Galasso *et al.* (2018). La raccolta di campioni d'erbario delle entità rilevate nel corso dei rilievi è fortemente raccomandata; diventa obbligatoria, invece, nel caso di entità, autoctone o esotiche, il cui dato di presenza rappresenti una novità rispetto al dato distributivo per la regione Campania secondo Bartolucci *et al.* (2018) e Galasso *et al.* (2018), ovvero

entità riportate come dubbie, non segnalate o non confermate. I campioni d'erbario dovranno essere preparati secondo quanto descritto in Amedei (2012). Nello stesso modo dovranno essere raccolti individui rappresentativi delle entità riportate come critiche dal punto di vista tassonomico in Bartolucci *et al.* (2018) oppure afferenti al genere *Festuca* e *Hieracium*.

Il materiale d'erbario al termine del servizio dovrà essere consegnato ad un Erbario pubblico italiano (Moggi 2012). Nel caso di entità elencate nella L.R. 40/94 o negli all. IV e V di Direttiva Habitat la raccolta dovrà essere evitata (ad eccezione dei casi in cui essa sia indispensabile per una corretta determinazione) e sostituita da documentazione fotografica idonea ad evidenziare i caratteri discriminanti delle entità.

Tutta la documentazione fotografica, sia quella relativa alla documentazione delle stazioni che quella delle specie rilevate, dovrà essere consegnata, organizzata in cartelle contrassegnate dal codice univoco del rilevamento utilizzato nell'archiviazione dei dati.

Nel caso di rilievi all'interno di plot questi saranno localizzati con l'apposizione di un picchetto metallico al centro, infisso profondamente nel suolo e sporgente per 10 cm circa con la testa di colore rosso o altri permanenti. La posizione del centro del plot sarà registrata tramite GPS.

Tutte le schede di campionamento saranno identificate da un codice univoco di 12 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dalle ultime due cifre del codice del Sito Natura 2000 oggetto dei rilevamenti, dalla sigla "P", da un numero progressivo di quattro cifre (ad esempio: PRPIC11P0001, ovvero rilievo numero 1 tra quelli relativi alle specie vegetali (*Plants*) nel territorio del raggruppamento di Siti PRPIC, nel Sito codice IT8040011).

Valutazione dello stato di conservazione

Gli indici di stato di conservazione di ciascuna specie si calcolano elaborando i dati delle loro carte di distribuzione e i dati raccolti durante le indagini. I risultati verranno archiviati nella banca dati Natura 2000 della Regione Campania.

Gli indici da calcolare sono elencati di seguito.

Estensione dell'areale di distribuzione

Le carte di distribuzione reale, aggiornate ad ogni sessione di monitoraggio secondo la frequenza indicata per ciascuna specie, permetteranno il calcolo dell'areale occupato dalla specie nel Sito, definito come la superficie inclusa nel più breve confine continuo che circonda tutte le stazioni in cui la specie è stata rilevata. L'areale può essere misurato come pari all'area del più piccolo poligono convesso (vale a dire in cui nessun angolo interno eccede i 180°) in grado di contenere tutti le stazioni in cui la specie ricorre.

Il confronto dell'estensione dell'areale registrato nelle varie sessioni di monitoraggio consentirà la valutazione del trend (stabile/aumento/decremento) di questa variabile nel tempo.

Numero di individui e trend della popolazione

Le stime del numero di individui e della capacità di rinnovamento degli stessi consentiranno un confronto nelle varie sessioni di monitoraggio e la valutazione del trend (stabile/aumento/decremento) di questa variabile nel tempo.

Indicatori della qualità dell'habitat

L'elaborazione dei dati floristico-vegetazionali consentirà un'analisi delle caratteristiche dell'habitat della specie e una valutazione del suo stato di conservazione, anche in rapporto alle pressioni/minacce registrate, per consentire una valutazione della qualità dell'habitat secondo la scala prevista a livello nazionale (buona, moderata, cattiva). Di seguito alcuni degli indicatori considerati:

Presenza (%) e relativi valori di copertura di specie di elevato valore biogeografico (endemiche) e/o incluse nelle Liste Rosse della Flora Italiana (Rossi *et al.* 2013, 2020).

Presenza (%) e relativi valori di copertura di **specie alloctone invasive** in relazione ai valori delle altre specie caratteristiche dell'habitat; l'aumento di questi valori rappresenta chiaramente un'alterazione in senso negativo dell'habitat

Presenza (%) e relativi valori di copertura di specie indicatrici di processi dinamici (ad esempio presenza di specie legnose in habitat di prateria); questo parametro non può essere considerato a priori un indicatore di peggioramento o miglioramento, ma le sue variazioni nel tempo possono fornire indicazione sull'efficacia delle misure di conservazione previste nel Piano di Gestione per l'habitat della specie

Presenza (%) e relativi valori di copertura di specie indicatrici di disturbo e/o antropizzazione (cosmopolite, nitrofile, impalatabili) in relazione alle altre specie caratteristiche dell'habitat.

Presenza di minacce/pressioni.

I parametri specie specifici sono comunque quelli individuati nel documento tecnico "Indicazioni operative per la compilazione della sezione 2 - obiettivi, attributi e target del format obiettivi e misure di conservazione", realizzato nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" - linea L1 "Gestione dei siti della Rete Natura 2000", disponibili sul portale www.naturacampania.it.

Schede metodologiche per le specie vegetali

1386 *Buxbaumia viridis*

Note: Muschio con particolare difficoltà di osservazione a causa delle sue caratteristiche biologiche (Ercole et al. 2016). L'unica stazione campana della specie non risulta confermata in tempi recenti ed è localizzata in modo vago. Questo rende indispensabile una prima fase di ricerca della stazione per una sua conferma. Vista le lacune conoscitive riguardo questa specie sono necessari rilevamenti speditivi per la sua ricerca anche in faggete limitrofe a quella in cui ricade la stazione nota.

Metodo di campionamento: Ai fini della ricerca della specie è necessario realizzare uno schema di rilevamento con plot circolari di 10 m di raggio, almeno 1 ogni 25 ha (reticolo sistematico con maglia 500 m x 500 m, generato dalla griglia di 1 km di lato del reticolato standard europeo fornita dalla Regione Campania), nelle aree in cui la specie era indicata. In ogni plot, georiferito e localizzato come indicato nella parte generale, sarà effettuato un rilevamento fitosociologico della flora vascolare e la conta e mappatura dei tronchi marcescenti. In ogni rilevamento successivo tutti i plot saranno visitati per verificare la presenza della specie. In caso di esito negativo delle ricerche il rilevamento sarà ripetuto ad una distanza di 20 gg per verificare l'eventuale emissione tardiva degli sporofiti. In caso di presenza della specie saranno evidenziati sulla mappa realizzata tutti i tronchi su cui essa è presente per la realizzazione della carta di distribuzione reale. Per ogni stazione saranno effettuati i rilievi previsti nella parte generale. In ogni sessione di monitoraggio tutti i plot caratterizzati dalla presenza di tronchi marcescenti individuati nella fase di realizzazione della carta di distribuzione saranno visitati per aggiornare le conoscenze sui dati distributivi.

Unità di campionamento: stazioni di presenza

Periodo di campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Tutte le stazioni in caso di rarità della specie (numero massimo di stazioni=10). Nel caso di elevata frequenza della specie saranno selezionate le stazioni rappresentative delle diverse condizioni ecologiche (altitudine, esposizione, inclinazione...) in cui la specie è presente e dei diversi fattori di rischio a cui è esposta, in numero pari a 10 + 2 stazioni ogni 10 stazioni eccedenti o sue frazioni (ad es. nel caso di 12 stazioni 10+2; nel caso di 33 stazioni 10+6).

Stima della dimensione della popolazione: L'indicatore di stima della popolazione è il numero di celle in cui la specie è presente con riferimento ad una griglia 1x1 km (grids 1x1).

Impegno umano: L'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora briologica e vascolare e della vegetazione

Attività di campo: per il campionamento è previsto l'impiego di un operatore senior (briologo) e di un operatore junior (flora vascolare). Nella fase di ricerca della specie, in un giorno possono essere rilevati circa 4 plot (numero variabile in funzione della difficoltà di raggiungimento dovuta a particolari condizioni topografiche). Il rilevamento speditivo nelle faggete limitrofe richiederà altre due giorni di indagini di campo. L'eventuale ripetizione della sessione in caso di esito negativo della ricerca della specie prevedrà esclusivamente la visita dei plot già rilevati. I rilievi previsti nella fase di monitoraggio vera e propria richiederanno un ulteriore giorno di campo.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: Le analisi in laboratorio (pianificazione delle attività di campo, realizzazione dei campioni d'erbario, riconoscimento, informatizzazione di dati) richiederanno 3 giorni di lavoro di un operatore senior

Frequenza di monitoraggio: Biennale

1468 *Dianthus rupicola*

Note: Le prevalenti caratteristiche geomorfologiche delle stazioni (pareti costiere e interne spesso ad elevata pendenza) rendono particolarmente difficile il monitoraggio, per il quale sarà in alcuni casi necessario effettuare i rilevamenti dal mare o da punti di osservazione utili.

Metodo di campionamento: La specie cresce prevalentemente su pareti verticali e subverticali, sia interne che prossime al mare. I rilevamenti saranno effettuati sia via mare che via terra e richiedono l'utilizzo di binocoli e macchina fotografica con obiettivo idoneo alla realizzazione sia di immagini dei singoli nuclei della specie, che di immagini rappresentative della stazione nel suo complesso. La realizzazione di immagini standardizzate è necessaria anche per stimare le variazioni delle popolazioni nel tempo. Tutte le stazioni delle specie osservate da lontano, sia dalla barca lungo la costa che dal più prossimo punto di osservazione nel caso di rupi interne, saranno georiferite tramite utilizzo di GPS; successivamente le coordinate delle stazioni saranno corrette facendo in modo che ricadano lungo la linea di costa basandosi sulla carta tecnica delle Regione Campania 1.5000.

Unità di campionamento: stazioni di presenza

Periodo di campionamento: giugno-agosto

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Selezione delle stazioni rappresentative delle diverse condizioni ecologiche (substrato, geomorfologia, esposizione, quota) in cui la specie è presente e dei diversi fattori di rischio a cui è esposta, in modo che siano rappresentative della variabilità all'interno del Sito. Fino a 5 stazioni di presenza nel Sito saranno monitorate tutte le stazioni. In caso di stazioni >5, il numero di stazioni selezionate sarà pari a 5 + 1 stazioni ogni 15 stazioni eccedenti o sue frazioni; in caso di stazioni >50, il numero di stazioni selezionate sarà pari a 8 + 1 stazione ogni 30 stazioni eccedenti o sue frazioni (es. nel caso di 82 stazioni 8+2; nel caso di 103 stazioni 8+2).

Stima della dimensione della popolazione: L'indicatore di stima di popolazione è l'area ricoperta in m² (area).

Impegno umano: L'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Attività di campo: per il campionamento è previsto l'impiego di un operatore senior e di un operatore junior. In un giorno possono essere rilevate 5 stazioni. In caso di campionamento dalla barca, 1 esperto senior accompagnato da personale non qualificato che conduce l'imbarcazione; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per la realizzazione di 10 unità di campionamento comprensive di rilievo fotografico.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: Il lavoro in laboratorio (pianificazione delle attività di campo, analisi delle immagini, pianificazione delle attività di campo, realizzazione dei campioni d'erbario, riconoscimento, informatizzazione di dati, mappatura della specie) richiederà 2 giornate di lavoro di un operatore senior per ogni giornata di attività di campo.

Frequenza di monitoraggio: Una sola sessione ogni 6 anni

4104 *Himantoglossum adriaticum*

Note: La distribuzione della specie in Campania è certamente sottostimata anche a causa della presenza di sottopopolazioni con caratteri intermedi rispetto all'affine *H. hircinum*. Si raccomanda pertanto di effettuare indagini speditive finalizzate alla ricerca della specie nel corso delle indagini relative agli Habitat 6210 e 6210 pf di cui la specie fa parte, anche nei Siti in cui non sia ancora segnalata la sua presenza.

Metodo di campionamento: Vista la criticità tassonomica della specie è richiesta la realizzazione di un'opportuna documentazione fotografica per permettere la verifica dell'identificazione della specie. In caso di esito negativo delle ricerche il rilevamento sarà ripetuto ad una distanza di 20 gg per verificare l'eventuale emissione tardiva degli scapi fiorali.

Unità di campionamento: plot circolare di raggio 2,5 m (stazioni molto estese); intera stazione (stazioni di piccole dimensioni)

Periodo di campionamento: maggio-giugno

Stima della dimensione della popolazione: L'indicatore di stima di popolazione è il numero di individui. Può essere ricavato calcolando l'area ricoperta in m² (area) e stimando il valore medio di densità.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Tutte le stazioni/plot in caso di rarità della specie (numero massimo di stazioni=5). Nel caso di elevata frequenza della specie saranno selezionate le stazioni rappresentative delle diverse condizioni ecologiche (substrato, geomorfologia, esposizione, quota) in cui la specie è presente e dei diversi fattori di rischio a cui è esposta, in modo che siano rappresentative della variabilità all'interno del Sito. In caso di stazioni >5, il numero di stazioni selezionate sarà pari a 5 + 1 stazioni ogni 15 stazioni eccedenti o sue frazioni; in caso di stazioni >50, il numero di stazioni selezionate sarà pari a 8 + 1 stazione ogni 30 stazioni eccedenti o sue frazioni (es. nel caso di 82 stazioni 8+2; nel caso di 103 stazioni 8+2).

Impegno umano: L'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un esperto senior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per il campionamento di 5 stazioni/plot. Da considerare la possibilità di ripetizione in caso di fioritura tardiva.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: una sola unità di personale senior con un impegno di 3 giorni lavorativi per 5 stazioni/plot; per un numero di stazioni/plot > 5 e fino a 50 stazioni/plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 5 stazioni/plot o frazione di 5; per un numero di stazioni/plot > 50 stazioni/plot, 1 giornata lavorativa aggiuntiva ogni 15 stazioni/plot o frazione di 15.

Frequenza di monitoraggio: una sessione di monitoraggio ogni sei anni

1628 *Primula palinuri*

Note: Le prevalenti caratteristiche geomorfologiche delle stazioni (pareti costiere e interne spesso ad elevata pendenza) rendono particolarmente difficile il monitoraggio, per il quale sarà in alcuni casi necessario effettuare i rilevamenti dal mare o dal più prossimo punto di osservazione nel caso di rupi interne.

Metodo di campionamento: I rilevamenti richiedono l'utilizzo di binocoli e macchina fotografica con obiettivo idoneo alla realizzazione sia di immagini dei singoli nuclei della specie, che di immagini rappresentative della stazione nel suo complesso. La realizzazione di immagini standardizzate è necessaria anche per stimare le variazioni delle popolazioni nel tempo. Per le stazioni interne sarà necessaria particolare attenzione alla ricerca di individui nelle praterie a minore inclinazione, dove la specie riesce eccezionalmente a sopravvivere. Tutte le stazioni delle specie osservate da lontano, sia lungo la costa dalla barca che dal più prossimo punto di osservazione nel caso di rupi interne, saranno georiferite tramite utilizzo di GPS; successivamente le coordinate delle stazioni saranno corrette facendo in modo che ricadano lungo la linea di costa basandosi sulla carta tecnica delle Regione Campania 1.5000.

Unità di campionamento: stazioni di presenza

Periodo di campionamento: gennaio-marzo

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Tutte le stazioni in caso di rarità della specie (fino a 5 stazioni di presenza). Selezione delle stazioni rappresentative delle diverse condizioni ecologiche (substrato, geomorfologia, esposizione, quota) in cui la specie è presente e dei diversi fattori di rischio a cui è esposta, in modo che siano rappresentative della variabilità all'interno del Sito. In caso di stazioni >5, il numero di stazioni selezionate sarà pari a 5 + 1 stazioni ogni 15 stazioni eccedenti o sue frazioni; in caso di stazioni >50, il numero di stazioni selezionate sarà pari a 8 + 1 stazione ogni 30 stazioni eccedenti o sue frazioni (es. nel caso di 82 stazioni 8+2; nel caso di 103 stazioni 8+2).

Stima della dimensione della popolazione: L'indicatore di stima di popolazione raccomandato è il numero di individui o, in subordine, l'area ricoperta in m² (area), annotando il valore medio di densità per unità di superficie.

Impegno umano: L'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione.

Attività di campo: per il campionamento è previsto l'impiego di un operatore senior e di un operatore junior. In un giorno possono essere rilevate 5 stazioni. In caso di campionamento dalla barca, 1 esperto senior accompagnato da personale non qualificato che conduce l'imbarcazione; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per la realizzazione di 10 unità di campionamento comprensive di rilievo fotografico.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: Il lavoro in laboratorio (pianificazione delle attività di campo, analisi delle immagini, informatizzazione di dati, mappatura della specie) richiederà 2 giornate di lavoro di un operatore senior per ogni giornata di attività di campo

Frequenza di monitoraggio: Biennale

1426 *Woodwardia radicans*

Note: Allo stato attuale delle conoscenze la specie è estremamente rara in Campania ma sarebbero necessarie ulteriori indagini per accertare l'effettiva scomparsa della specie da tutte le numerose stazioni in cui era nota nel passato, sia in Penisola Sorrentina che ad Ischia. Si consiglia pertanto di effettuare indagini speditive finalizzate alla ricerca della specie nei territori in cui risulta segnalata.

Metodo di campionamento: Le stazioni attualmente note non mostrano particolari difficoltà per la realizzazione delle attività. Si consiglia l'uso del binocolo per la ricerca di eventuali nuove stazioni.

Unità di campionamento: stazioni di presenza

Periodo di campionamento: marzo-ottobre

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Tutte le stazioni

Stima della dimensione della popolazione: L'indicatore di stima di popolazione raccomandato è il numero di individui; può essere ricavato calcolando l'area ricoperta in m² (area) e stimando il valore medio di densità per unità di superficie.

Impegno umano: l'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Attività di campo: l'attività deve essere svolta da un operatore senior e da uno junior; si stima l'impegno di una giornata di lavoro per ogni Sito

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: Le analisi in laboratorio (pianificazione dell'attività di campo, realizzazione dei campioni d'erbario, riconoscimento, informatizzazione di dati) richiederanno 2 giorni di lavoro di un operatore senior.

Frequenza di monitoraggio: Annuale

6955 *Eokochia saxicola*

Note: Le caratteristiche geomorfologiche delle stazioni note (falesie ad elevata pendenza) rendono particolarmente difficile il monitoraggio, per il quale è necessario effettuare le osservazioni prevalentemente dal mare.

Metodo di campionamento: I rilevamenti richiedono l'utilizzo di binocoli e macchina fotografica con obiettivo idoneo alla realizzazione sia di immagini dei singoli nuclei della specie, che di immagini rappresentative della stazione nel suo complesso. La realizzazione di immagini standardizzate è necessaria anche per stimare le variazioni delle popolazioni nel tempo. Tutte le stazioni delle specie osservate saranno georiferite tramite utilizzo di GPS; successivamente le coordinate delle stazioni saranno corrette facendo in modo che ricadano lungo la linea di costa basandosi sulla carta tecnica delle Regione Campania 1:5000.

Unità di campionamento: stazioni di presenza.

Periodo di campionamento: Metà settembre-metà novembre

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Tutte le stazioni di presenza

Stima della dimensione della popolazione: L'indicatore di stima di popolazione è il numero di individui o l'area ricoperta in m² (area), annotando il valore medio di densità per unità di superficie.

Impegno umano: L'attività deve essere svolta da personale esperto in rilievi della flora e della vegetazione

Attività di campo: per il campionamento è previsto l'impiego di un operatore senior e di un operatore junior. In un giorno possono essere rilevate tutte le stazioni ricadenti in un Sito.

Attività di laboratorio ed elaborazione dati: Il lavoro in laboratorio (pianificazione dell'attività di campo, analisi delle immagini, realizzazione dei campioni d'erbario, riconoscimento, informatizzazione di dati) richiederà 2 giornate di lavoro di un operatore senior.

Frequenza di monitoraggio: Biennale

Tabella riassuntiva del periodo di campionamento per ciascuna specie

	Mese											
Taxon	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<i>Buxbaumia viridis</i>						X	X	X				
<i>Dianthus rupicola</i>						X	X	X				
<i>Eokochia saxicola</i>									X	X	X	
<i>Himantoglossum adriaticum</i>					X	X						
<i>Primula palinuri</i>	X	X	X									
<i>Woodwardia radicans</i>			X	X	X	X	X	X	X	X		

Campionamento delle specie animali

In ciascun Sito, per ogni specie, il monitoraggio si compone delle seguenti azioni:

1. realizzazione della carta di distribuzione
2. stima dello stato di conservazione


Alla replica da effettuarsi dopo 6 anni, si ripeteranno tutte le azioni su elencate.

Per la tassonomia delle specie si fa riferimento alla *checklist* art. 17 disponibile sul portale www.naturacampania.it.

Carte di distribuzione

La carta di distribuzione di una determinata specie si realizza attraverso le seguenti azioni:

1. identificazione delle aree di presenza potenziale, in base alla distribuzione dei parametri ambientali (vegetazione, ecc.) che ne caratterizzano l'habitat, secondo quanto definito dalle conoscenze bibliografiche disponibili;
2. divisione delle aree di presenza potenziale in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD); esse possono rappresentare porzioni non contigue dell'areale di presenza potenziale, oppure porzioni di areale con diverse caratteristiche ambientali, significative per la specie considerata; ad esempio, in un'estesa area forestale dominata da faggio si possono individuare diverse PTD in base all'età media degli alberi, al tipo di governo del bosco, ecc.; allo stesso modo, un'area di presenza potenziale rappresentata da un fiume, andrebbe divisa in PTD in base al diverso regime della corrente delle acque, al tipo di sponda (terra, ghiaia, ecc.), alla vegetazione presente sulle rive (caneto, foresta, ghiaia nuda, ecc.); le PTD di ogni specie saranno archiviate in formato digitale vettoriale, secondo gli standard descritti di seguito, nel sistema di coordinate UTM 33 - WGS84 (EPSG 32633);
3. individuazione delle unità di campionamento per ciascuna PTD o, secondo i casi, in un campione di quest'ultime; il numero di unità di campionamento dovrà essere rappresentativo e direttamente proporzionale all'estensione delle PTD; inoltre, con riferimento alla divisione del territorio regionale in quadrati di 1 km di lato nel reticolato standard europeo con sistema di proiezione LAEA5210-ETRS89 (EPSG 3035), disponibile presso la Regione Campania, si farà in modo che vi sia almeno un'unità di campionamento per ciascun quadrato di 1 km di lato, salvo quanto diversamente previsto nelle schede metodologiche specie-specifiche; le Unità di campionamento saranno archiviate in formato digitale vettoriale, secondo gli standard descritti di seguito, nel sistema di coordinate UTM 33 - WGS84 (EPSG 32633);
4. esecuzione di rilievi su campo nelle unità di campionamento, secondo le metodologie specie-specifiche indicate nelle schede seguenti; i dati sono raccolti in campo utilizzando le schede allegate e dovranno essere archiviati nella banca dati Natura 2000 della Regione Campania;
5. elaborazione dei dati rilevati per calcolare stime di popolazione per ciascuna PTD, secondo quanto descritto nelle schede specie-specifiche; in tal modo la distribuzione di una specie coincide con la superficie delle PTD in cui è stata rilevata (stima di



popolazione > 0); i dati elaborati saranno archiviati nella banca dati Natura 2000 della Regione Campania.

Stato di conservazione

Gli indici di stato di conservazione di ciascuna specie nei Siti Natura 2000, si calcolano elaborando i dati delle loro carte di distribuzione e i dati raccolti durante le indagini.

Gli indici da calcolare sono elencati di seguito.

I risultati verranno archiviati nella banca dati Natura 2000 della Regione Campania.

Dimensione della popolazione

Si ricava elaborando le stime di popolazione nelle PTD di ciascun Sito Natura 2000, secondo quanto descritto nelle schede specie-specifiche.

Estensione complessiva dell'areale di distribuzione reale e potenziale

Si assume che la distribuzione potenziale sia quella ricavata al punto 1. delle azioni per la realizzazione della carta di distribuzione. La distribuzione reale, invece, è quella che si ricava dall'insieme delle PTD in cui la specie è stata rilevata (punto 5. delle azioni precedentemente descritte). Vengono espresse in unità di misura diverse, secondo la natura delle PTD (cfr. capitolo *Conservazione e gestione dei dati*): ettari, nel caso di PTD poligonali; km, in caso di PTD lineari; numeri interi (frequenza assoluta), in caso di PTD puntiformi.

Differenza tra areale di distribuzione reale e potenziale

La differenza tra le due distribuzioni viene espressa in ettari, km o numeri interi, secondo la natura delle PTD della specie considerata.

Numero delle tessere in cui si articola l'areale di distribuzione reale e potenziale

All'interno di un Sito, o di un gruppo di Siti, la distribuzione di una specie risulterà divisa in diverse aree di presenza (insieme di PTD adiacenti), separate tra loro, ognuna definita *tessera*. L'indicatore è dato dal numero di tali tessere, considerando separatamente il caso della distribuzione reale da quella potenziale.

Dimensione della tessera più estesa dell'areale di distribuzione reale e potenziale

E' la dimensione della tessera più estesa tra quelle descritte precedentemente. Si calcola solo per le distribuzioni ricavate da PTD poligonali (ettari) o lineari (chilometri).

Rapporto perimetro/superficie dell'areale di distribuzione reale e potenziale

Si calcola con l'indice di Edge Density (McGarigal *et al.* 2002): $ED = P/A$, dove: P è la somma dei perimetri di tutte le tessere, in metri, ed A è la superficie complessiva in ettari. Si calcola solo per le distribuzioni ricavate da PTD poligonali.

Parametri specie specifici

I parametri specie specifici sono quelli individuati nel documento tecnico "Indicazioni operative per la compilazione della sezione 2 - obiettivi, attributi e target del format obiettivi e misure di conservazione", realizzato nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" - linea L1 "Gestione dei siti della Rete Natura 2000", disponibili sul portale www.naturacampania.it.

Schede metodologiche per gli invertebrati

1016 *Vertigo moulinsiana* e altre specie di molluschi

Note: Tra i molluschi gasteropodi del genere *Vertigo*, elencati nell'all. II della Direttiva Habitat, nei formulari dei siti Natura 2000 della regione Campania viene citata presente solo *V. moulinsiana*, mentre recenti ricerche dimostrano la presenza anche di altre specie. Durante i campionamenti deve essere registrata la presenza di tutte le specie del genere *Vertigo* inserite in uno degli allegati della Direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Si utilizza il metodo del campionamento visivo in plot (Moorkens e Killeen 2011). Prevede la raccolta a mano degli individui, all'interno dei plot.

Periodo di campionamento: Nei mesi tra marzo e maggio e tra settembre e novembre, scegliendo giornate poco umide.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Il territorio del Sito viene diviso in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) dove, per caratteristiche ambientali, può essere presente la specie. In ciascuna PTD vengono scelti non meno di 6 plot. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "VER", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_VER_PTD_001). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "VER", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_VER_P_001).

Frequenza temporale: Il campionamento va eseguito in due giorni diversi a distanza di almeno una settimana, l'uno dall'altro.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie nei plot viene attribuita all'intera PTD in cui i plot sono ubicati. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. L'indicatore di stima della popolazione è il numero di celle in cui la specie è presente con riferimento ad una griglia 1x1 km (grid1x1).

Impegno umano: Per il campionamento è previsto l'impiego di un solo operatore senior. In un giorno un operatore riesce ad effettuare campionamenti in un massimo di 24 plot. Per la elaborazione dei dati è sufficiente un giorno di lavoro.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

1092 *Austropotamobius pallipes*

Note: La tassonomia di *Austropotamobius pallipes* è al momento confusa. Attualmente vi è un certo consenso nel considerare il *taxon* come rappresentato da un complesso di due specie, *A. pallipes* e *A. italicus*. In questo contesto non si fa distinzione tra le due specie. Durante i campionamenti deve essere registrata la presenza di eventuali specie alloctone di gamberi di fiume.

Metodo di campionamento: Il metodo di campionamento (Reynolds *et al.* 2010) prevede il conteggio notturno dei gamberi attivi sulle rive. Il rilievo va effettuato lungo transetti; nel caso di ambienti fluviali, il corso d'acqua va risalito a piedi da valle a monte, campionando lungo transetti di 100 m (Stock e Genovesi 2016).

Periodo di campionamento: Il periodo migliore per effettuare i campionamenti è luglio-agosto, quando i giovani sono ormai indipendenti e non si rischia di arrecare danno alle femmine ovigere che si trovano sul letto del corpo d'acqua. I campionamenti devono essere effettuati dal tramonto all'alba, quando gli animali sono più attivi.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Il numero di transetti deve essere stabilito in base all'estensione del territorio lacustre o fluviale e all'eterogeneità ambientale. Il tratto fluviale o la sponda lacustre vanno divisi in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), , rappresentate da linee, in base all'habitat delle sponde e alle caratteristiche del corso d'acqua (ad es. torrentizio rive ghiaiose, rive boscate, ecc.). In ciascuna PTD si scelgono uno o più transetti in base alla lunghezza della PTD. Mediamente i transetti, nel loro insieme, devono coprire almeno il 10 % della lunghezza delle rive lacustri o del corso d'acqua. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "CRU", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CRU_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "CRU", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CRU_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (*Austropotamobius*).

Frequenza temporale: Ogni transetto va eseguito 2 volte, in giorni diversi, a distanza di almeno una settimana l'uno dall'altro.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in ciascun transetto viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi lineari, in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza: $n^\circ \text{ di adulti} / \text{km}$ complessivi di transetti nella PTD., considerando per ogni transetto il valore massimo di individui osservato nelle 2 repliche. La dimensione della popolazione nelle PTD si calcola moltiplicando gli indici chilometrici di abbondanza per la lunghezza delle PTD. La dimensione della popolazione nel Sito si calcola sommando i valori ottenuti nelle PTD.

Impegno umano: E' sufficiente la presenza di un solo operatore senior sebbene, dovendo effettuare il rilevamento in ore notturne in ambienti potenzialmente scivolosi, è consigliata la presenza di un coadiutore. In una notte un operatore riesce ad effettuare il campionamento in un massimo di 5 transetti, da replicare in una seconda notte. Pertanto, si prevede un minimo di due giornate (nottate) di campo per ciascun insieme di 5 transetti. Per l'elaborazione dei dati è sufficiente un giorno di lavoro a Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Odonati

Note: Le specie di Odonati di all. II segnalate nei formulari standard sono: *Coenagrion mercuriale*, *Cordulegaster trinacriae*, *Lyndenia tetraphylla*, *Oxygastra curtisii*. Oltre alle specie di all. I durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di Odonati di all. II, IV e V della direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Il monitoraggio degli odonati può essere effettuato mediante conteggio diretto degli individui adulti osservati lungo transetti in habitat riproduttivi idonei in una fascia di 2,5 metri di distanza su ciascun lato dal rilevatore (Stock e Genovesi 2016). Per facilitare la determinazione degli individui si può ricorrere alla cattura con retino entomologico a cerchio rigido e successiva liberazione degli animali. Il campionamento deve essere effettuato, tra le ore 10 e le 16 (UTC+1) in giornate prive di vento, pioggia e condizioni meteo-ambientali che possano interferire sulla capacità di osservazione, possibilmente soleggiate (Trizzino *et al.* 2013).

Periodo di campionamento

Coenagrion mercuriale: aprile - luglio

Cordulegaster trinacriae: giugno-agosto

Lyndenia tetraphylla: giugno-agosto

Oxygastra curtisii: maggio-luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Il territorio del Sito viene diviso in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) di forma lineare corrispondente a sponde di fiume, bacino idrico e ad altre zone umide. In ogni PTD, viene scelto uno o più transetti lineari di 100 m ciascuno. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "ODO", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ODO_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "ODO", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ODO_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni sulla specie riscontrate, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Odonati).

Frequenza temporale: Ogni transetto va eseguito 3 volte, in giorni diversi, opportunamente distribuiti nel periodo di campionamento di ciascuna specie (ad esempio, nel caso di siti in cui siano presente *Lyndenia tetraphylla* e *Oxygastra curtisii*, i transetti si dovranno eseguire 3 volte tra maggio e giugno e 3 volte nel mese di luglio).

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in ciascun transetto viene attribuita all'intera PTD entro cui il transetto è ubicato. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi lineari, in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza: $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$ considerando il totale degli individui e dei chilometri complessivi nella PTD e, per ogni transetto, il valore massimo di individui osservato nelle 3 repliche. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \sum Pop_{PTD}$.

Impegno umano. E' sufficiente un solo operatore senior. In un giorno, un operatore riesce ad effettuare il campionamento in un massimo di 10 transetti. Qualora in un Sito siano presenti più specie, va considerato che non sempre i loro habitat coincidono; pertanto, in tali casi, ad ogni specie si dedicherà una sessione di campionamento, aumentando proporzionalmente le giornate di campo. Per l'elaborazione dei dati sono sufficienti un giorno di lavoro per ciascun Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

5381 *Osmoderma italicum*

Note: *O. eremita* s. str. fa parte di un complesso di specie, la cui tassonomia è ancora incerta. *O. italicum* è un'endemita del Sud Italia, dal Cilento alla Calabria; tuttavia, in un recente studio su base molecolare (Audisio *et al.*, 2009) *O. italicum* sarebbe una sottospecie di *O. eremita*. I metodi di monitoraggio non cambiano tra le tre entità tassonomiche, per cui in questo piano si usa la denominazione dell'endemita *O. italicum*. Oltre a *Osmoderma italicum* durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di Coleotteri di all. II, IV e V della direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: L'accertamento della presenza avviene attraverso la ricerca diretta dell'adulto o alberi con segni riconoscibili di presenza lungo transetti, ricercando sui tronchi o nelle cavità entro una fascia di 2,5 m da ogni lato del transetto, coprendo per ogni chilometro percorso una superficie di 0,5 ettari (*visual encounter survey*, VES) (Chiari *et al.* 2012, 2013).

Periodo di campionamento: Tra luglio e agosto.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) entro cui individuare transetti in corrispondenza dei quali effettuare i rilievi con il metodo indicato. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_T_001). Nel caso nel raggruppamento di Siti Natura 2000 si debbano rilevare altri coleotteri, si farà attenzione a non utilizzare codici uguali per transetti diversi. Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Coleotteri).

Frequenza temporale: Ogni PTD va rilevata 4 volte nel periodo di campionamento, in 4 giorni diversi, uno in ciascuna settimana.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade almeno un transetto con rilevamento positivo. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$. IK si calcola sommando gli individui rilevati in tutti i transetti della PTD (per ogni transetto si considera il numero massimo rilevato nelle 3 repliche) e sommando i chilometri. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \sum Pop_{PTD}$. In alternativa si possono rilevare gli alberi abitati e ricavare la popolazione mediante una stima del numero di individui per alberi abitato.

Impegno umano. E' previsto un solo operatore senior. Ogni giorno un operatore riesce a visitare fino a 4 Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Per l'elaborazione dei dati si richiede un giorno ogni Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

1086 *Cucujis cinnaberinus*

Note: Oltre a *Cucujis cinnaberinus* durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di Coleotteri di all. II, IV e V della direttiva Habitat.

Metodo di campionamento. L'accertamento della presenza avviene attraverso la ricerca diretta dell'adulto e delle larve sotto la corteccia degli alberi marcescenti o cataste di legna, lungo transetti entro una fascia di 2,5 m da ogni lato del transetto, coprendo per ogni chilometro percorso una superficie di 0,5 ettari (Mazzei *et al.* 2011, Trizzino *et al.* 2013).

Periodo di campionamento. da maggio a luglio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) entro cui effettuare i rilievi lungo transetti con il metodo indicato. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_T_001). Nel caso nel raggruppamento di Siti Natura 2000 si debbano rilevare altri coleotteri, si farà attenzione a non utilizzare codici uguali per transetti diversi. Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Coleotteri).

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni PTD va eseguito 4 volte nel periodo di campionamento, in giorni diversi.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade almeno un transetto con rilevamento positivo. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$. IK si calcola sommando gli individui rilevati in tutti i transetti della PTD (per ogni transetto si considera il numero massimo rilevato nelle 3 repliche) e sommando i chilometri. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine, si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \sum Pop_{PTD}$. In alternativa si possono rilevare gli alberi abitati e ricavare la popolazione mediante una stima del numero di individui per alberi abitato.

Impegno umano: E' previsto un solo operatore senior. Ogni giorno un operatore riesce a visitare da 2 a 4 transetti. Per la elaborazione dei dati si richiede un giorno ogni Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Note: Oltre a *Rosalia alpina* durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di Coleotteri di all. II, IV e V della direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Il campionamento si effettua su transetti (Stock e Genovesi 2016) che collegano almeno 5 plot, coincidenti con piante vetuste con chiari sintomi di deperimento (fruttificazioni fungine, parti di legno morto sia nel tronco sia nei rami), alberi morti in piedi, alberi sradicati, ceppaie con radici interrate, grossi rami spezzati a terra (diametro > 20 cm), cataste di legna. Ogni plot va ispezionato accuratamente alla ricerca degli adulti entro una fascia di 2,5 m da ogni lato del transetto, coprendo per ogni chilometro percorso una superficie di 0,5 ettari. L'operatore prenderà nota di ogni individuo osservato.

Periodo di campionamento: Il campionamento dovrà essere svolto nei mesi di luglio e agosto, in giornate soleggiate tra le ore 13.00 e 17.30 (UTC+1).

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) entro cui effettuare i rilievi lungo transetti con il metodo indicato. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_T_001). Nel caso nel raggruppamento di Siti Natura 2000 si debbano rilevare altri coleotteri, si farà attenzione a non utilizzare codici uguali per transetti diversi. Allo stesso modo si dovranno identificare i plot, attraverso un codice di 17 caratteri, composto dal codice del transetto lungo il quale è uno collocato ciascun plot, seguito da trattino "underscore" e un numero progressivo di una cifra da 1 a 5 (ad esempio: REGNA_COL_T_001_1). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (*Rosalia*).

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni unità di campionamento va eseguito 4 volte nel periodo di campionamento, in giorni diversi.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade almeno un transetto con rilevamento positivo. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$. IK si calcola sommando gli individui rilevati in tutti i transetti della PTD (per ogni transetto si considera il numero massimo rilevato nelle 3 repliche) e sommando i chilometri. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \sum Pop_{PTD}$. In alternativa si possono rilevare gli alberi abitati e ricavare la popolazione mediante una stima del numero di individui per alberi abitato.

Impegno umano: E' necessario un operatore senior. In un giorno di campo, un operatore riesce a visitare circa 4 unità territoriali di campionamento. Per la elaborazione dei dati è previsto un giorno di lavoro per Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Cerambyx cerdo e altri Cerambicidi

Note: Oltre a *Cerambyx cerdo* durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di Coleotteri di all. II, IV e V della direttiva Habitat.

Metodo di campionamento L'accertamento della presenza avviene attraverso la ricerca diretta dell'adulto, l'osservazione di resti e la presenza dei peculiari fori di sfarfallamento sui tronchi o nelle cavità lungo transetti entro una fascia di 2,5 m da ogni lato del transetto, coprendo per ogni chilometro percorso una superficie di 0,5 ettaro (Stock e Genovesi 2016). Per evitare che vengano considerati fori di sfarfallamento avvenuti in anni precedenti, porre attenzione al loro aspetto; in particolare, quelli dell'anno in corso non devono essere particolarmente anneriti e devono presentare il tipico rosone grossolano dei fori di sfarfallamento dei cerambicidi.

Periodo di campionamento Nei mesi di giugno e luglio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) entro cui effettuare i rilievi lungo transetti con il metodo indicato. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_COL_T_001). Nel caso nel raggruppamento di Siti Natura 2000 si debbano rilevare altri coleotteri, si farà attenzione a non utilizzare codici uguali per transetti diversi. Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Coleotteri).

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni unità di campionamento va eseguito 3 volte nel periodo di campionamento, una volta in ciascun mese.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade almeno un transetto con rilevamento positivo. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$. IK si calcola sommando gli individui rilevati in tutti i transetti della PTD (per ogni transetto si considera il numero massimo rilevato nelle 3 repliche) e sommando i chilometri. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine, si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \sum Pop_{PTD}$. In alternativa si possono rilevare gli alberi abitati e ricavare la popolazione mediante una stima del numero di individui per alberi abitato.

Impegno umano: E' previsto un solo operatore senior. Ogni giorno un operatore riesce a visitare fino a 4 unità campionarie omogenee. Per la elaborazione dei dati si richiede un giorno ogni Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Lepidotteri Ropaloceri

Note: Tra i Lepidotteri Ropaloceri elencati nell'all. B del DPR 357/97 e succ.mod.ii., nei formulari dei siti Natura 2000 sono attualmente citati *Euphydryas aurinia*, *Melanargia arge*. Oltre a queste specie durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di Lepidotteri di all. II, IV e V della direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Queste specie sono campionabili facilmente allo stadio adulto con il metodo del transetto semi-quantitativo (Pollard e Yates 1993), seguendo il protocollo dell'European Butterfly Monitoring Schemes (Sevilleja et al. 2019; https://butterfly-monitoring.net/sites/default/files/Pdf/Manual/Butterfly%20Transect%20Counts-Manual%20v1_italian.pdf). Il transetto deve prevedere una lunghezza costante (al massimo 1 km; 500 m in caso di alta densità di farfalle) o un intervallo temporale determinato (solitamente 1 h). Il transetto viene diviso in sezioni di 50 o 100 m ciascuna continue tra loro (secondo la lunghezza totale del transetto) identificate con le coordinate geografiche del punto centrale approssimativo della sezione; in ciascuna sezione si contano gli individui osservati in una scatola immaginaria di 5 metri di lunghezza davanti al rilevatore, 5 metri di altezza e 2,5 metri di distanza su ciascun lato dal rilevatore; in tal modo ogni chilometro percorso copre una superficie di 0,5 ettari. Deve essere eseguito nelle ore centrali della giornata con cielo sereno e assenza di vento. Il rilevatore conta gli individui rilevati camminando lungo il transetto a passo costante; può effettuare delle pause ma solo per identificare evitando di contare quando si è fermi e guardando indietro, per evitare doppi conteggi dello stesso individuo. La specie di ogni individuo osservato viene determinata a vista o, in caso dubbio, dopo aver raccolto l'esemplare con retino da Lepidotteri ed averlo esaminato da vicino; gli animali catturati saranno liberati sul posto dopo la determinazione specifica.

Periodo di campionamento: Il periodo di campionamento cambia secondo le specie, come segue:

Euphydryas aurinia: maggio e ottobre

Melanargia arge: da maggio a luglio

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) entro cui effettuare i rilievi lungo transetti con il metodo indicato. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LEP_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "LEP", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LEP_T_001). Nel caso nel raggruppamento di Siti Natura 2000 si debba rilevare anche *Euplagia quadripunctaria*, si farà attenzione a non utilizzare codici uguali per transetti diversi. Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Lepidotteri.).

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni transetto va eseguito 3 volte nel periodo di campionamento, una volta ogni mese. In caso in un Sito siano presenti entrambe le specie, è necessario prevedere che ogni transetto sia eseguito in 4 giorni diversi distribuiti tra maggio e luglio.

Stima della dimensione della popolazione. La presenza di ogni specie viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade almeno un transetto con rilevamento positivo. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$. IK si calcola sommando gli individui rilevati in tutti i transetti della PTD (per ogni transetto si considera il numero massimo rilevato nelle 3 repliche) e sommando i chilometri. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \sum Pop_{PTD}$.

Impegno umano. È previsto un solo operatore senior. In un giorno si possono campionare fino a 4-5 transetti, secondo la distanza tra loro. Per la elaborazione di dati occorre 1 giorno per Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

6199 *Euplagia quadripunctaria*

Note: Nessuna

Metodo di campionamento: Queste specie sono campionabili a vista allo stadio adulto quando si alimentano sui fiori delle piante nutrici (*Eupatorium cannabinum* e *Sambucus ebulus*) durante le ore diurne in ambiente boschivo. Gli adulti devono essere campionati con il metodo del transetto semi-quantitativo (Pollard e Yate, 1993). Il transetto deve prevedere una lunghezza costante (consigliato 1 km) o un intervallo temporale determinato (solitamente 1 h) rilevando entro una fascia di 2,5 m da ogni lato del transetto, coprendo per ogni chilometro percorso una superficie di 0,5 ettari.

Periodo di campionamento: luglio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) entro cui effettuare i rilievi lungo transetti con il metodo indicato. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "COL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LEP_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "LEP", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LEP_T_001). Nel caso nel raggruppamento di Siti Natura 2000 si debbano rilevare altri lepidotteri, si farà attenzione a non utilizzare codici uguali per transetti diversi. Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Lepidotteri.doc).

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni transetto va eseguito 2 volte nel periodo di campionamento, in giorni diversi distanziati di almeno una settimana.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade almeno un transetto con rilevamento positivo. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali in ognuno dei quali si riporta la presenza o l'assenza di individui, indicando il numero di individui stimati come segue (0 in caso di assenza). Per ogni PTD si calcola dapprima l'indice chilometrico di abbondanza $IK = n^{\circ} \text{ di adulti} / km$. IK si calcola sommando gli individui rilevati in tutti i transetti della PTD (per ogni transetto si considera il numero massimo rilevato nelle 3 repliche) e sommando i chilometri. Poiché ogni km percorso copre una superficie di 0,5 ettari, IK viene trasformato in densità con l'equivalenza $D_{PTD} = 2 * IK_{PTD}$. Successivamente si calcola la dimensione della popolazione presente in ciascuna PTD, moltiplicando la densità per gli ettari: $Pop_{PTD} = D_{PTD} * ettari_{PTD}$; infine, si sommano i valori di tutte le PTD presenti nel sito Natura 2000: $Pop = \Sigma Pop_{PTD}$.

Impegno umano. È previsto un solo operatore senior. In un giorno si possono campionare circa 3 transetti. Per la elaborazione di dati occorre un giorno per Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Schede metodologiche per i pesci

1099 *Lampetra fluviatilis*

1096 *Lampetra planeri*

1095 *Petromyzon marinus*

1103 *Alosa fallax*

1120 *Alburnus albidus*

5097 *Barbus tyberinus*

5305 *Cobitis zanandreae*

1136 *Rutilus rubilio*

5349 *Salmo cetti*

5331 *Telestes muticellus*

Note: Comprende le specie che nella Direttiva Habitat sono classificate genericamente come “pesci”, includendo sia gli Agnati che gli Osteitti. Oltre alle specie di all. II, durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di ittiofauna.

Metodo di campionamento: I metodi indicati in questo documento si riferiscono al campionamento nelle acque interne. Nei corsi d'acqua guadabili, il campionamento viene effettuato mediante elettropesca (APAT 2007). Tale tecnica prevede l'utilizzo di elettrostorditori a corrente continua pulsata e voltaggio modulabile, per ambienti ritrati, e di tipo a impulsi, per ambienti potamali. Nelle tipologie potamali si opera generalmente con isolamento del settore di indagine mediante l'utilizzo di reti a tramaglio, che, oltre ad evitare emigrazioni o immigrazioni possono costituire un efficace strumento di cattura. Si opera generalmente mediante passaggi ripetuti con lo storditore in settori preventivamente delimitati, procedendo da valle a monte. La lunghezza del tratto sarà proporzionale all'ampiezza dell'alveo bagnato, nella misura compresa tra pochi metri e 50 m (la lunghezza del tratto in ciascuna unità di campionamento andrà registrata). Le operazioni di campionamento ed analisi dell'ittiofauna sono di tipo conservativo. L'uso della corrente elettrica, ad amperaggi non elevati, permette la cattura dei pesci senza recare loro danno. Al termine delle operazioni di determinazione essi devono essere liberati. Per gli agnati si ricercano lungo transetti gli stadi giovanili delle tre specie e gli adulti di *L. planeri*, nei pressi dei substrati molli di infossamento. Nei fiumi non guadabili e nei bacini d'acqua si utilizzeranno i metodi di cattura più appropriati al caso che potranno essere elettropesca lungo transetti o in plot, o utilizzo di reti e altri sistemi di cattura, con o senza l'uso di imbarcazione, avendo cura di campionare tutti gli habitat di possibile presenza delle specie.

Periodo di campionamento: Il campionamento andrà effettuato tra agosto e ottobre, evitando i giorni successivi a piogge intense, quando i corsi d'acqua hanno portata maggiore e acque torbide. Per *Alosa fallax* il periodo corrisponde a quello riproduttivo, tra aprile e giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Il corso d'acqua, o la riva del bacino idrico, va diviso in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), di forma lineare corrispondenti a tratti fluviali o di riva lacustre, in base alle caratteristiche ambientali (ad es. alveo torrentizio rive ghiaiose, rive boscate, profondità, ecc.). I transetti devono essere scelti in maniera rappresentativa della estensione di ciascuna PTD. Mediamente i transetti devono coprire almeno il 10% della lunghezza delle rive lacustri o del corso d'acqua; normalmente, nei corsi d'acqua di dimensione minore, la lunghezza del transetto non deve essere inferiore a 20 volte la larghezza dell'alveo. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino “underscore”, dalla sigla “ITT”, dal trattino “underscore”, dalla sigla “PTD”, dal trattino “underscore” e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ITT_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino “underscore”, dalla sigla “ITT”, dal trattino “underscore”, dalla sigla “T”, dal trattino “underscore” e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ITT_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Ittiofauna). Nei bacini d'acqua e nei corsi non guadabili qualora non avesse senso distinguere più PTD se ne considererà solo una di superficie pari al bacino o al tratto di corso non guadabile considerato.

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni transetto va eseguito 2 volte nel periodo di campionamento, in mesi diversi.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in ciascun transetto viene attribuita all'intera PTD entro cui ricade. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi lineari. I risultati dovranno essere usati per calcolare, per ogni PTD, l'indice chilometrico di abbondanza: $IK_{PTD} = n^{\circ} \text{ totale di individui (media delle due repliche)} / \text{km complessivi di transetti in ciascuna PTD}$. Quindi si calcola la stima degli individui presenti nella PTD moltiplicando l'indice chilometrico per la lunghezza della PTD in km: $Individui_{PTD} = IK_{PTD} \times km_{PTD}$. La stima del numero di individui all'interno di ciascun Sito si calcola con la somma degli individui calcolati per ciascuna PTD. Qualora si ritenga che tale stima fosse inattendibile o si preferisca una alternativa al calcolo del numero di individui, per ogni sito si potrà usare la somma dei chilometri di tutte le PTD in cui una specie è stata rilevata, annotando comunque una stima della densità media per tratto fluviale. Nel caso di bacini d'acqua o dei fiumi non guadabili, piuttosto che utilizzare il numero dei km delle PTD con rilievo positivo si può usare la superficie in m^2 . Qualora i bacini o i fiumi non guadabili non fossero distinti in più PTD, si userà la superficie totale del bacino in m^2 . Il numero di individui considera anche le forme giovanili (avannotti).

Impegno umano. È previsto un operatore senior accompagnato da due operatori junior. In un giorno di lavoro di campo si possono controllare 4 transetti. Per la elaborazione di dati occorre 1 giorno per Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Schede metodologiche per gli anfibi

5357 *Bombina pachypus*

1175 *Salamandrina terdigitata*

5367 *Salamandrina perspicillata*

1167 *Triturus carnifex*

Note: L'attribuzione a livello specifico di *B. pachypus* è dubbia, ma in questo contesto va considerata. Le due specie di *Salamandrina* sono difficilmente distinguibili su base morfologica. In casi dubbi si mantenga la nomenclatura usata nei formulari di ciascun Sito, o ricorrere a indagini biomolecolari. Oltre a queste specie, durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di anfibi di all. II, IV e V della Direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Il campionamento viene effettuato attraverso la ricerca a vista degli individui adulti e delle larve in plot scelti in aree giudicate idonee ad ospitare le specie dal punto di vista ambientale, lungo tratti prestabiliti di ruscelli e torrenti; nel caso di siti artificiali (fontane/fontanili, lavatoi, abbeveratoi) con scarsa visibilità, è necessario perlustrare attentamente il fondo e le pareti con l'aiuto di un retino di dimensioni adeguati alla raccolta d'acqua e alla specie (Stock e Genovesi 2016). Nei corsi d'acqua, evitare i giorni successivi a piogge intense, quando si riscontra una maggiore portata e acque torbide. Il campionamento in ogni stazione deve durare fino a 60 minuti. Oltre alla presenza della specie, va registrata anche l'età, lo stadio di sviluppo o la presenza di ovature.

Periodo di campionamento:

Per le specie di *Salamandrina*, il periodo ottimale va da aprile ad agosto a seconda delle località. Gli adulti sono generalmente osservabili da aprile, gli ammassi di uova restano visibili per circa un mese e le larve possono permanere in acqua, in siti che non si prosciugano, fino a fine agosto.

Per *Triturus carnifex* il campionamento deve essere effettuato nei mesi di maggio e giugno.

Per *Bombina pachypus* il periodo dei campionamenti è compreso tra marzo ad agosto. Maggio-luglio sono i mesi preferibili per il campionamento degli adulti in acqua.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per queste specie non è prevista l'individuazione di Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD); il rilievo verrà effettuato in plot corrispondenti ai siti riproduttivi potenziali scelti in base a caratteristiche ambientali ritenute idonee per ciascuna specie. Il numero di plot variano in ciascun Sito in base al numero di aree ritenute idonee. Nel caso di pozze, sorgenti o altri piccoli bacini di origine antropica il campionamento prevede la ricerca in tutto il bacino d'acqua. Nel caso di corsi d'acqua o bacini d'acqua di maggiore superficie si provvederà a posizionare lungo le sponde una serie di plot scelti in numero tale che siano rappresentativi dei diversi tratti di corso d'acqua da campionare. Ogni plot verrà identificato da un codice di 13 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "ANF", dal trattino "underscore" e un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ANF_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Anfibi).

Frequenza temporale: Il rilievo in ogni stazione deve essere eseguito 3 volte, in giorni diversi, nel periodo di campionamento di ciascuna specie. Qualora si debbano campionare in un plot specie diverse, va considerato che i 3 giorni si riferiscono a ciascuna specie, fermo restando la possibilità di far coincidere i giorni di campionamento di più specie qualora debbano essere eseguiti nel medesimo mese.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione sarà rappresentata da elementi puntiformi, corrispondenti alle stazioni in cui è stata rilevata la presenza. La carta rappresenta solo i plot con esito positivo, mentre non vengono rappresentati quelli dove la specie non è stata rilevata. Per ciascun Sito, come indicatore di popolazione, si ricaverà il numero di individui stimando il numero massimo in ciascuna stazione di presenza.

Impegno umano: E' previsto un solo operatore senior. In ogni giornata sono visitabili da 5 a 10 stazioni di campionamento, secondo la difficoltà di spostarsi sul campo. Per l'elaborazione dei dati occorre 1 giorno in ciascun Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Schede metodologiche per i rettili

1220 *Emys orbicularis*

Note: Oltre a *Emys orbicularis*, durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di rettili di all. II, IV e V della Direttiva Habitat, oltreché di tartarughe appartenenti a specie alloctone (ad es. *Trachemys scripta*).

Metodo di campionamento: I rilievi sono eseguiti con osservazioni in plot individuati lungo le sponde dei corsi d'acqua o dei bacini idrici (Stock e Genovesi 2016). In ogni plot il rilevatore sosta durante il periodo di 20 minuti. Sono da evitare le giornate ventose, con pioggia o con abbondante copertura nuvolosa.

Periodo di campionamento: Il campionamento va effettuato tra i mesi di maggio e agosto.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza della specie sarà divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), di forma lineare in corrispondenza di tratti di corso o bacino d'acqua, lungo ciascuna delle quali si individuerà un numero di plot in maniera rappresentativa, assicurando una distanza tra loro superiore a 50 m. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "REO", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_REO_PTD_001). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "REO", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_REO_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Emys).

Frequenza temporale: Ciascun plot viene eseguito 2 volte nel periodo di campionamento, in giorni e mesi diversi.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in ciascun transetto (o insieme di plot), viene attribuita all'intera PTD in cui il transetto ricade. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi lineari. Una volta calcolato per ogni transetto la media del numero di individui registrati nelle due repliche, per ogni PTD si calcolerà l'indice chilometrico di abbondanza dividendo la somma degli individui nei diversi transetti per i chilometri complessivi nella PTD: $IK_{PTD} = n^{\circ} \text{ di individui}_{PTD} / \text{km dei transetti complessivi nella PTD}$. Per ciascuna PTD si stima poi la popolazione moltiplicando l'indice di abbondanza della PTD per la sua lunghezza in chilometri: $indiv_{PTD} = IK_{PTD} * km_{PTD}$. La stima della popolazione all'interno di ciascun Sito si calcola con la somma dei valori ottenuti nelle diverse PTD il valore medio dell'indice calcolato in ciascuna PTD.

Impegno umano: E' previsto un solo operatore senior. In una giornata si possono rilevare oltre 10 plot. L'elaborazione dei dati richiede un giorno per Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

1217 *Testudo hermannii*

Note: Sebbene non siano note popolazioni naturalizzate di testuggini alloctone, non è da escludere la possibilità che, durante i campionamenti di *T. hermannii*, si possa incontrare qualche esemplare di *T. graeca*, che andrebbe immediatamente segnalato e fotografato (evidenziando i caratteri distintivi della specie). Oltre a *Testudo hermannii*, durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di rettili di all. II, IV e V della Direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Si utilizza il metodo delle osservazioni dirette, in plot a forma di poligono ben delimitato di circa 1 ettaro, la cui superficie andrà valutata sulla base delle condizioni locali (Stock e Genovesi 2016). La ricerca va effettuata attivamente, a vista, all'interno di ciascun plot. I rilevamenti vanno eseguiti con modalità standard (stesso sforzo di campionamento, medesime modalità di ricerca, fascia oraria e stagione), per ottenere dati confrontabili. Ogni individuo osservato verrà marcato individualmente in modo temporaneo (es. con pennarelli indelebili atossici o lacca per unghie) nella porzione posteriore del carapace, utilizzando una sigla a numeri progressivi, per facilitarne l'individuazione anche attraverso la semplice osservazione a distanza. La ricerca va concentrata nelle ore centrali del giorno; nei giorni caldi di giugno nelle primissime ore del mattino. Sono da preferire giornate soleggiate, poco ventose, preferibilmente successive a periodi freschi o piovosi.

Periodo di campionamento: Il periodo per i campionamenti è compreso tra aprile e giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza della specie sarà divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), in ciascuna delle quali si individuerà uno o più plot di 1 ettaro in maniera rappresentativa della superficie della PTD. In caso le condizioni della vegetazione o dell'ambiente in generale non consentissero la perlustrazione di plot di 1 ettaro, si sceglieranno più plot di superficie minore, cercando di raggiungere la superficie complessiva di 1 ettaro. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "RTH", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_RTH_PTD_001). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "RTH", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_RTH_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Testudo).

Frequenza temporale: Ogni plot va eseguito 4 volte, in giorni diversi, distribuiti all'interno del periodo di campionamento. Il secondo rilevamento va eseguito dopo 1-2 giorni dal primo; i successivi nei mesi seguenti opportunamente distanziati l'uno dall'altro.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in ciascun plot, viene attribuita all'intera PTD. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo di campionamento indicato consente la stima della popolazione, all'interno del plot di 1 ettaro, con il metodo della cattura/ricattura (White e Burnham 1999). La stima della popolazione in ciascuna PTD si calcola moltiplicando la media della stima di popolazione in ciascun plot da 1 ettaro ricadente nella PTD per la superficie della PTD in ettari. Nel caso che i dati raccolti non fossero sufficienti per calcolare la popolazione con i metodi cattura/ricattura, si elaboreranno indici di abbondanza come: $n^{\circ} \text{ individui} / Ha$, utilizzando il numero di individui diversi osservati nell'insieme delle repliche temporali. In tale evenienza per ogni PTD si calcolerà l'indice di abbondanza con la media dell'indice calcolato in ciascun plot. La stima della popolazione nel Sito si ottiene sommando le stime calcolate per ciascuna PTD con il metodo della cattura e ricattura. Nel caso sia stato calcolato l'indice di abbondanza, si moltiplicherà l'indice di abbondanza per la superficie della PTD e su sommeranno i valori ottenuti nelle diverse PTD per avere una stima di dimensione di popolazione nel sito Natura 2000.

Impegno umano: E' previsto un solo operatore senior, che riuscirà a campionare almeno 2 plot di 1 ettaro ciascuno in un giorno.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Note: Considerate le differenti fasi del ciclo vitale di questa specie, il monitoraggio deve necessariamente prevedere due tipologie di azioni, una per i siti di nidificazione ed una per le aree in mare aperto. In questo documento si descriveranno solo gli aspetti relativi al monitoraggio dei siti di nidificazione. Il monitoraggio dei nidi viene eseguito annualmente da organizzazioni coordinate dalla Stazione Zoologica A. Dohrn, con autorizzazione in deroga. In questa scheda vengono indicati solo i metodi di elaborazione dei dati ai fini dell'aggiornamento dei FS, mentre la descrizione dei metodi di campionamento è riportata solo per completezza.

Metodo di campionamento: Nelle aree caratterizzate da eventi di nidificazione con frequenza regolare e/o annuale il monitoraggio viene svolto tramite pattugliamento notturno degli arenili interessati, suddivisi in settori omogenei per caratteristiche fisiografiche, al fine di intercettare le femmine nidificanti durante la risalita della spiaggia. Nel caso di aree molto ampie, il pattugliamento può essere effettuato di giorno, purché nelle prime ore del mattino al fine di precedere l'eventuale cancellazione delle tracce dovuta al calpestio dei bagnanti. Le tracce di emersione/nidificazione consentono di accertare la presenza del nido e la sua esatta localizzazione deve essere geo-referenziata e marcata al fine di permettere la raccolta dati post-schiusa. (La Mesa *et al.* 2019)

Periodo di campionamento: Il periodo per i campionamenti è compreso tra maggio e settembre.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale presenza della specie, corrispondente agli arenili sabbiosi, sarà divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "RCC", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_RCC_PTD_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Caretta).

Frequenza temporale: Il pattugliamento delle spiagge deve essere condotto durante l'intero periodo di nidificazione almeno 3 volte in una settimana.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione sarà rappresentata da elementi puntiformi, corrispondenti alle stazioni in cui è stata rilevata la nidificazione. La carta rappresenta solo i plot con esito positivo, mentre non vengono rappresentati quelli dove la specie non è stata rilevata. Per ciascun Sito, come indicatore di popolazione, si ricaverà il numero di individui stimando il numero massimo in ciascuna stazione di presenza. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione nel Sito, espressa come *n° di femmine in riproduzione*.

Impegno umano: E' previsto un solo operatore senior, che in un giorno riuscirà a campionare un numero variabile di plot secondo la loro dimensione.

Frequenza di monitoraggio: Ogni anno.

1279 *Elaphe quatuorlineata*

Note: Oltre a *Elaphe quatuorlineata*, durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di rettili di all. II, IV e V della Direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: Il campionamento si basa sulla ricerca a vista lungo transetti prestabiliti di ambienti idonei (boschi, ambienti agricoli, fasce ecotonali, corsi d'acqua). Inoltre, si dovranno eseguire ricerche mirate in siti idonei, mediante l'osservazione di cavità di alberi, pietraie, ruderi. Sono da preferire giornate soleggiate successive a periodi di maltempo; sono da evitare giornate con temperature basse o troppo elevate, e condizioni meteorologiche avverse. Per ogni individuo osservato si annoterà il sesso e l'età (Stock e Genovesi 2016).

Periodo di campionamento: Il periodo di campionamento è compreso tra maggio e giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di potenziale di presenza va divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) omogenee per caratteristiche ambientali; per questa specie, può essere considerato omogeneo anche un paesaggio a mosaico con aree che presentano diversa tipologia di habitat su superfici molto piccole, ad esempio inferiori a 1 ettaro; nelle PTD si eseguiranno le ricerche mirate descritte precedentemente. In caso il numero di PTD risultasse eccessivo, si può scegliere un campione per ciascuna loro tipologia. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito da trattino "underscore", dalla sigla "REQ", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_REQ_PTD_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Elaphe).

Frequenza temporale: In ogni PTD le ricerche mirate vanno eseguite fino a 3 volte (finché la specie non sia stata rilevata), in giorni diversi, opportunamente distribuiti nei 2 mesi di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione. La presenza della specie, durante le ricerche mirate, viene attribuita all'intera PTD in cui è rilevata. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Come indicatore di stima di popolazione, in mancanza di stime del numero di individui, si potrà usare il numero di stazioni (*localities*) in cui la specie è presente (stazioni = PTD in caso queste siano di piccole dimensioni).

Impegno umano: È previsto un solo operatore senior. In una giornata di campionamento si può rilevare una o al massimo 2 PTD.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Schede metodologiche per i mammiferi

Chiroteri

Note: La scheda riguarda le specie di Chiroteri. Oltre a quelle specie segnalate nel formulario del Sito, durante i campionamenti deve essere registrata la presenza anche di altre specie di chiroteri di all. II, IV e V della Direttiva Habitat.

Metodo di campionamento: L'obiettivo è individuare i rifugi riproduttivi, invernali e di *swarming* nel Sito e determinare le specie presenti. Una volta individuati i potenziali rifugi, la presenza delle specie viene accertata con l'impiego congiunto di reti (*mist-net*) per la cattura e di rilevatori di ultrasuoni (*bat detector*), secondo le condizioni logistiche e la specie da rilevare, in prossimità dei potenziali rifugi (Stock e Genovesi 2016). Oltre ai rifugi, vengono ricercate aree di frequentazione abituale (alimentazione, ecc.). In tal caso il rilevamento nelle località di indagine viene eseguito con registratori di ultrasuoni (*bat detector*) tenuti in funzione tutta la notte (tipicamente da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba) e successiva analisi dei sonogrammi.

Periodo di campionamento

Rifugi riproduttivi: maggio-agosto

Rifugi di *swarming*: tardo estate-autunno

Rifugi invernali: gennaio-febbraio

Aree di frequentazione abituale: variabile secondo i Siti; per un rilevamento generico mesi tra maggio e settembre.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per queste specie non è prevista l'individuazione di Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). La ricerca dei rifugi deve essere eseguita considerando le aree potenzialmente idonee, non trascurando le cavità di origine antropica e le aree boschive. Ogni rifugio o località visitata viene trattato come un plot e verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "CHI", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CHI_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulle specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Chiroteri).

Frequenza temporale: Sono necessari 1 rilievo per anno in corrispondenza di ciascun rifugio invernale, 2 rilievi per i rifugi riproduttivi, 3 rilievi per quelli di *swarming*. Per le aree di frequentazione sono richieste 3 repliche per ciascun plot distribuite in modo rappresentativo tra maggio e settembre.

Stima della dimensione della popolazione: La distribuzione delle specie è rappresentata dai plot con esito positivo. La carta di distribuzione è costituita da elementi puntiformi ognuno rappresentante un rifugio o un plot frequentato (non vengono rappresentati i plot visitati con esito negativo). Il metodo di campionamento indicato non consente una stima della popolazione, se non per i rifugi. L'indicatore di popolazione è il numero di individui nei rifugi o il numero di località di presenza (1 località = 1 plot). Per ciascun sito, si potrà stimare il numero di individui in base a valori medi di presenza stimati dall'esperto o il numero di località (plot/rifugi positivi).

Impegno umano: Il numero di giornate di campo varia secondo la tecnica di campionamento. Per quanto riguarda l'impiego di rilevatori ad ultrasuoni è richiesto un solo operatore senior; mentre per la cattura sono richiesti un rilevatore senior e due junior. Per le aree di frequentazione basta 1 rilevatore per il montaggio e lo smontaggio dei registratori.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

1352 *Canis lupus*

Metodo di campionamento: La distribuzione della specie viene stimata attraverso l'uso combinato di 3 tecniche di campionamento (Ciucci e Boitani 2010, Marucco 2014): tracciatura delle piste su neve (*snow tracking*), fototrappolaggio e ululato indotto (*wolf-howling*). La tracciatura delle piste su neve consente di acquisire dati di presenza/assenza attraverso il rilievo di tracce indirette (orme, urina, feci, ecc.). Il rilievo avviene lungo transetti fissi visitati ripetutamente nel periodo invernale. Il fototrappolaggio consente di ottenere dati di presenza/assenza disponendo un significativo numero di fototrappole a sensore PIR invisibile in habitat di potenziale presenza e lungo vie di potenziale spostamento per il lupo. La tecnica dell'ululato indotto viene utilizzata per localizzare i rendez-vous. Si applica in plot di ascolto da cui controllare un'area di campionamento vasta.

Periodo di campionamento

Snow tracking: in periodo di innevamento (generalmente tra dicembre e marzo)

Fototrappolaggio: tutto l'anno

Wolf howling: tarda estate

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: I rilievi si eseguono con i tre metodi di campionamento in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "MCL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_MCL_PTD_001).

Snow tracking: Il rilievo avviene lungo transetti fissi scelti in modo rappresentativo nelle PTD; ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "MCL", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_MCL_T_001).

Fototrappolaggio: il rilievo avviene utilizzando un numero di fototrappole ubicate nelle PTD; ogni fototrappola verrà identificata da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "MCL", dal trattino "underscore", dalla sigla "F", dal trattino "underscore" e un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_MCL_F_001).

Wolf howling: il rilievo avviene utilizzando un numero di plot nelle PTD; ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "MCL", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_MCL_P_001).

Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni sulla specie riscontrate, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzeranno le schede allegate, secondo il metodo di campionamento (Canis_fototrappole, Canis_transetti, Canis_WH).

Frequenza temporale

Snow tracking: ogni transetto va eseguito 2 volte in giorni diversi nel periodo di campionamento

Fototrappolaggio: le fototrappole vanno tenute installate per almeno 3 mesi e controllate ogni mese, spostando quelle che non hanno rilevato alcuna presenza di lupo.

Wolf howling: ogni plot va eseguito in 3 notti in giorni consecutivi o al massimo intervallati di 2 giorni.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie, su transetto, nei plot o nelle fototrappole, viene attribuita all'intera PTD in cui è rilevata. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Per valutare la dimensione della popolazione, si utilizzerà una stima del numero di individui, basandosi sulle orme su neve, sulle immagini registrate dalle fototrappole e sulle risposte ai richiami. Per ciascuna PTD la stima della popolazione si basa tutte le informazioni ricavate dai diversi tipi di campionamento, sommando o facendo la media dei valori nelle diverse unità di campionamento (transetti, fototrappole o plot di *wolf howling*). Per ciascun Sito la stima della popolazione si ottiene sommando o facendo la media dei valori nelle diverse PTD, secondo l'opinione dell'esperto.

Impegno umano

Snow tracking: un operatore senior percorrerà 1 transetto in 1 giorno

Fototrappolaggio: un operatore senior e un operatore junior in 1 giorno sistemano un numero di circa 30 fototrappole

Wolf howling: 1 operatore senior impegnato 3 giorni in ciascun sito di ascolto. In una notte un operatore può rilevare in un numero di siti variabile in base alla loro distanza e alla difficoltà di raggiungerlo, considerato che a volte si tratta di zone da raggiungere a piedi. Mediamente si potranno effettuare da 1 a massimo 3 siti a notte.

L'elaborazione dei dati richiede 1 giorno a Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

1355 *Lutra lutra*

Note: Nessuna

Metodo di campionamento: Le popolazioni di lontra in Europa sono monitorate sistematicamente attraverso la metodologia standard raccomandata dall'IUCN *Otter Specialist Group* (Reuther *et al.* 2000). Questa si basa sulla ricerca di segni di presenza della specie (tracce ed escrementi) lungo transetti di 600 m di riva. Il controllo delle rive e di elementi emergenti in alveo viene generalmente eseguito a piedi.

Periodo di campionamento: Il periodo ottimale per i campionamenti è da giugno a settembre, quando le frequenze di marcatura sono elevate e i segni di presenza non vengono dilavati dalle piogge.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Il fiume viene diviso in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) per tipologia ambientale (tipo di riva, portata, larghezza, ecc.), di forma lineare corrispondenti a tratti di corso d'acqua. In ciascuna PTD si individuano uno o più transetti lunghi 600 m ciascuno. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "LUT", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LUT_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "LUT", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LUT_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni sulla specie riscontrate, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Lutra).

Frequenza temporale: Ogni transetto va eseguito una sola volta.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie su transetto viene attribuita all'intera PTD in cui ricade. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi lineari. Il metodo di campionamento indicato non consente una stima della popolazione. Esso dovrà essere usato per calcolare l'indice relativo di abbondanza per ciascun transetto: *n° segni di presenza / km*. Come indicatore di dimensione della popolazione nel Sito si userà il numero di quadrati di una griglia 1x1km in cui la specie è presente (grids1x1).

Impegno umano: E' previsto un operatore senior. In un giorno è possibile rilevare un minimo di 4 transetti. L'elaborazione dei dati richiede 1 giorno a Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Schede metodologiche per gli uccelli

A236 *Dryocopus martius*

A868 *Leicopicus medius*

Note: Nei formulari dei Siti aggiornati al 2017, il *taxon* A868 *Leicopicus medius* è citato come A238 *Dendrocopos medius*. Il campionamento è riferito alla popolazione nidificante. Durante i campionamenti si registrerà, comunque, la presenza anche delle altre specie di Picidi eventualmente rilevate.

Metodo di campionamento : Il metodo si basa sulla possibilità di stimolare la risposta territoriale degli adulti in riproduzione, consistente in emissioni di suoni facilmente percepibili anche ad una certa distanza (Marion *et al.* 1981, Gagliardi e Tosi 2012). Dapprima il rilevatore si posiziona al centro del plot per verificare la presenza di eventuali attività territoriali spontanee (emissioni sonore o di altro tipo). In caso che non venga rilevato alcun contatto entro i primi 5 minuti, si procederà con la tecnica del *playback*, ovvero riproducendo il canto territoriale ad un volume tale che possa esser udito ad una distanza media di 100-150 m (un volume eccessivo provoca la fuga degli animali). Si alterneranno 3 serie di 20 secondi di stimolazione sonora seguiti da 30 secondi di ascolto. Qualora si debba rilevare la presenza di più specie diverse è preferibile iniziare con la specie a canto meno forte (l'intensità è in genere proporzionale alla dimensione dell'individuo); quindi iniziare con la stimolazione di *Leicopicus medius* e poi proseguire con *Dryocopus martius*. Tra la stimolazione di una specie e l'altra è necessario far trascorrere il tempo di almeno 2 minuti. L'orario di rilevamento inizia un'ora dopo l'alba e prosegue per le 4 ore successive.

Periodo di campionamento: Il periodo di campionamento è corrispondente ai mesi da marzo a maggio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Devono essere previsti plot di campionamento distribuiti in maniera rappresentativa nelle diverse Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Nell'individuazione delle PTD si escluderanno le porzioni forestali con superficie inferiore al territorio medio della specie considerata. Il numero di plot per ciascuna PTD dipende dalla sua superficie. È conveniente individuare i plot lungo un transetto lineare che attraversa la PTD e scegliere un plot ogni 500 m. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "PIC", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_PIC_PTD_001). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "PIC", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_PIC_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ciascun plot va eseguito 3 volte, in mesi diversi.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In un giorno si possono rilevare un massimo di 10 plot.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie nei plot viene attribuita all'intera PTD che rappresentano. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo porta a stime quantitative di dimensione di popolazione. È possibile ricavare stime di densità (n° coppie / kmq) basandosi sui metodi standard (Hutto *et al.* 1986, Reynolds *et al.* 1980). La stima della densità viene effettuata per ciascuna PTD e la dimensione della popolazione viene stimata moltiplicando la densità in ciascuna unità per la sua superficie. In ogni plot si considera presente una coppia qualora venga rilevata in almeno una delle repliche temporali. La stima della popolazione nel Sito viene calcolata sommando i valori nelle diverse unità territoriali.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Note: Il campionamento è riferito alla popolazione nidificante. Durante i campionamenti si registrerà la presenza anche delle altre specie di uccelli nidificanti negli argini fluviali eventualmente rilevate.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto lungo un transetto da posizionare lungo la riva degli habitat acquatici dove la specie è potenzialmente presente (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilievo di adulti in periodo riproduttivo viene effettuato per osservazione diretta in volo o su posatoio, oppure con ascolto dei tipici fischi che vengono emessi durante gli spostamenti. I rilievi vanno effettuati dall'alba fino alle 4 ore successive.

Periodo di campionamento: Il periodo di campionamento coincide con i mesi di maggio e giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: I transetti devono essere distribuiti in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), di forma lineare, corrispondenti alle sponde dei corsi d'acqua che presentano caratteristiche corrispondenti all'habitat potenziale della specie. Ogni transetto deve essere lungo almeno 500 m (o pari alla lunghezza del tratto fluviale, se questa è inferiore a 500 m). Qualora non possa essere percorso un transetto di questa dimensione, andrà diviso in più transetti. La lunghezza totale dei transetti in una PTD deve essere rappresentativa della sua lunghezza. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "ALC", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ALC_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "ALC", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ALC_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_transetto).

Frequenza temporale: Ciascun transetto va eseguito 2 volte, in giorni e mesi diversi.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in un transetto viene attribuita all'intera PTD in cui ricade. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi lineari. Il metodo porta a stime quantitative di popolazione. In ogni PTD si calcola l'indice : $n^{\circ} \text{ coppie} / km$, utilizzando i dati dei rilievi lungo i transetti che vi ricadono (si considera presente una coppia qualora venga rilevata in almeno una delle repliche temporali). Quindi, si stima la dimensione della popolazione moltiplicando l'indice per la lunghezza totale della PTD. La stima della dimensione della popolazione nel Sito viene eseguita sommando i valori ottenuti nelle diverse PTD.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In ogni giornata di campionamento si possono percorrere dai 2 ai 4 km di transetto, secondo le condizioni orografiche e il numero di transetti previsti.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Note: Il campionamento è riferito alla popolazione nidificante.

Metodo di campionamento: Il metodo di rilievo è il conteggio primaverile con utilizzo del richiamo acustico (playback), che prevede la stimolazione degli individui territoriali mediante emissione di un canto territoriale preregistrato (Bernard Laurent e Laurent 1984, Gagliardi e Tosi 2012). Lungo un transetto il rilevatore sosta ogni 100 m emettendo il richiamo; si alterneranno 3 serie di 20 secondi di stimolazione sonora seguiti da 30 secondi di ascolto. L'orario di campionamento è compreso tra 30 minuti prima dell'alba e le due ore successive. Vanno evitate le giornate di vento forte e con condizioni meteo avverse che possano alterare la risposta territoriale dei maschi oltre che la percezione dei richiami sonori.

Periodo di campionamento: Il periodo di campionamento è compreso tra il 01 aprile e il 15 maggio, quando le coppie sono già formate.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Ogni Porzione del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) sarà visitata percorrendo un transetto che attraversi una superficie campione dell'intera PTD. Ogni transetto deve essere lungo almeno 1.000 m; qualora un transetto di tale dimensione non possa essere percorso è possibile suddividerlo in più transetti. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "ALE", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ALE_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "ALE", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ALE_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_transetto).

Frequenza temporale: Ogni transetto va eseguito 2 volte in giorni e mesi diversi.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in un transetto viene attribuita all'intera PTD che rappresenta. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo porta a stime quantitative di densità, mediante l'utilizzo dell'indicatore: $n^{\circ} \text{coppie/kmq}$, utilizzando i modelli di calcolo del metodo del transetto (Buckland 1993, Emlen 1971). La densità viene stimata per ciascuna PTD, considerando il valore massimo rilevato nelle due repliche temporali. La popolazione viene stimata moltiplicando il valore della densità in ogni PTD per la sua superficie. La popolazione del Sito viene stimata sommando i valori ottenuti nelle diverse PTD.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento si possono percorrere dai 2 ai 4 km di transetto secondo le condizioni orografiche e al numero di transetti previsti.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A091 *Aquila chrysaethos*
A101 *Falco biarmicus*
A103 *Falco peregrinus*
A346 *Pyrrhocorax pyrrhocorax*

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti. Il rilievo può essere effettuato insieme a quello di altri rapaci rupestri, avendo cura di coprire tutti i mesi di maggiore attività indicati per le diverse specie.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto dei siti riproduttivi (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilevatore visita ripetutamente le pareti rocciose di potenziale presenza sostando in loro prossimità a lungo, in attesa del possibile arrivo degli adulti al nido. Durante l'attesa le pareti devono essere esplorate a distanza con un cannocchiale. È importante rispettare una distanza adeguata dalle pareti per non indurre comportamenti diffidenti da parte degli adulti che, oltre a mettere a rischio il successo riproduttivo, non lascerebbero rilevare la presenza del nido. La presenza di adulti di *Aquila chrysaethos* in volo è poco utile per scovare il nido a causa dell'ampio territorio di caccia di queste specie, che può comprendere territori distanti anche molti chilometri dal nido, mentre per le altre specie può essere utile a circoscrivere l'area di indagine, in particolare in presenza di comportamenti territoriali in volo. I rilievi possono essere effettuati in tutte le ore del giorno.

Periodo di campionamento:

Per *Aquila chrysaethos*, il periodo di campionamento coincide con il mese di marzo, quando si assiste a una maggiore territorialità. Il periodo può essere anche esteso dal 10 febbraio al 15 aprile, ma solo per aumentare in numero di giornate di rilievo, che devono sempre comprendere il mese di marzo.

Per le altre specie, i rilievi iniziano a metà febbraio, quando si stabiliscono i territori riproduttivi e continuano fino a tutto aprile.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per queste specie non è prevista l'individuazione di Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Devono essere previste visite a tutte le pareti rocciose che possono ospitare potenzialmente nidi della specie. Ogni parete visitata verrà considerata un plot, identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "RUP", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_RUP_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ogni parete va visitata fino a 5 volte, in giorni diversi, opportunamente distanziati durante il periodo di campionamento, fin quando non venga accertato l'eventuale utilizzo per la nidificazione. Il numero di giorni deve essere fino a 5 per ciascuna specie, potendo includere nella stessa giornata il rilievo di specie diverse se previsto nello stesso mese.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione indica i siti di nidificazione, rappresentati come elementi puntiformi. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione di popolazione nel Sito, espressa come *n° di coppie*.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate almeno 2 o più pareti secondo la facilità di raggiungerle nell'arco della stessa giornata.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti.

Metodo di campionamento : Il metodo prevede il campionamento diretto dei siti riproduttivi (Bakalaoudis *et al.* 2005, Gagliardi e Tosi 2012). Il rilevatore visita ripetutamente le aree idonee; una volta individuata la presenza di individui in una zona, si circoscrivono le indagini alla ricerca del nido che viene posto generalmente su un grosso albero. A tale scopo può essere utile l'osservazione da punti rialzati da cui si abbia una buona visuale dell'area di possibile nidificazione. L'osservazione può richiedere alcune ore di attesa, durante le quali si devono esplorare a distanza le chiome degli alberi con un cannocchiale. Poiché il rilevamento del nido sugli alberi può risultare difficoltoso, si dovranno registrare anche le osservazioni di elementi indicatori di nidificazione, come: il trasporto di materiale per la costruzione del nido, il trasporto di cibo o il volo con i genitori di giovani appena involati. I rilievi possono essere effettuati in tutte le ore del giorno.

Periodo di campionamento: Da maggio a giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: I rilievi avvengono in ciascuna Porzione del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) individuata nel Sito. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "CIR", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CIR_PTD_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Rapaci_arb).

Frequenza temporale: Ogni area va visitata almeno 5 volte, in giorni diversi, opportunamente distribuiti nel periodo di campionamento, specialmente in giugno, quando è scarsa la probabilità di incontrare individui in passo migratorio, fin quando non venga accertata l'eventuale nidificazione.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata dalle PTD in cui sono ubicati i nidi; pertanto è costituita da elementi poligonali. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione in ciascuna PTD e nel Sito, espressa come *n° di coppie*.

Impegno umano. È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate fino a 4 aree se facilmente raggiungibili nell'arco della stessa giornata.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A074 Milvus milvus

A073 Milvus migrans

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto dei siti riproduttivi (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilevatore visita ripetutamente le aree idonee; una volta individuata la presenza di individui in una zona, si circoscrivono le indagini alla ricerca del nido che viene posto generalmente su un grosso albero, a volte utilizzando nidi di altre specie (corvidi). A tale scopo può essere utile l'osservazione da punti rialzati da cui si abbia una buona visuale dell'area di possibile nidificazione. L'osservazione può richiedere alcune ore di attesa, durante le quali si devono esplorare a distanza le chiome degli alberi con un cannocchiale. Poiché il rilevamento del nido sugli alberi può risultare difficoltoso, si dovranno registrare anche le osservazioni di elementi indicatori di nidificazione, come, il trasporto di materiale per la costruzione del nido, il trasporto di cibo o il volo con i genitori dei giovani appena involati. I rilievi possono essere effettuati in tutte le ore del giorno.

Periodo di campionamento: Il campionamento inizia a partire da fine marzo-inizio aprile, quando si stabiliscono i territori, e prosegue fino a giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: I rilievi avvengono in ciascuna Porzione del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) individuata nel Sito. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "MIL", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_MIL_PTD_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Rapaci_arb).

Frequenza temporale: Ogni area va visitata fino a 5 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento, fin quando non venga accertato l'eventuale utilizzo per la nidificazione.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata dalle PTD in cui sono ubicati i nidi; la carta è costituita da elementi poligonali. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione in ciascuna PTD e nel Sito, espressa come *n° di coppie*.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate fino a 4 aree se facilmente raggiungibili nell'arco della stessa giornata.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto dei siti riproduttivi (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilevatore visita ripetutamente le aree idonee; una volta individuata la presenza di individui in una zona, si circoscrivono le indagini alla ricerca del nido che viene posto generalmente su un grosso albero, a volte utilizzando nidi di altre specie (corvidi). A tale scopo può essere utile l'osservazione da punti rialzati da cui si abbia una buona visuale dell'area di possibile nidificazione. L'osservazione può richiedere alcune ore di attesa, durante le quali si devono esplorare a distanza le chiome degli alberi con un cannocchiale. Poiché il rilevamento del nido sugli alberi può risultare difficoltoso, si dovranno registrare anche le osservazioni di elementi indicatori di nidificazione, come, il trasporto di materiale per la costruzione del nido, il trasporto di cibo o il volo con i genitori dei giovani appena involati. I rilievi possono essere effettuati in tutte le ore del giorno.

Periodo di campionamento: Il campionamento inizia a partire da fine aprile-metà maggio, quando si stabiliscono i territori, e prosegue fino a giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: I rilievi avvengono in ciascuna Porzione del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) individuata nel Sito. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "PER", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_PER_PTD_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Rapaci_arb).

Frequenza temporale: Ogni area va visitata fino a 5 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento, fin quando non venga accertato l'eventuale utilizzo per la nidificazione.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata dalle PTD in cui sono ubicati i nidi; la carta è costituita da elementi poligonali. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione in ciascuna PTD e nel Sito, espressa come *n° di coppie*.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate fino a 4 aree se facilmente raggiungibili nell'arco della stessa giornata.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A215 Bubo bubo

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti. Non si hanno notizie certe sulla presenza di questa specie negli ultimi 20 anni e probabilmente è estinta.

Metodo di campionamento: Il metodo si basa sulla possibilità di stimolare la risposta territoriale degli adulti, consistente in emissioni di suoni facilmente percepibili dal rilevatore anche ad una certa distanza (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilevatore si posiziona al centro di un plot di campionamento per evidenziare eventuali attività territoriali (emissioni sonore o di altro tipo). In caso che non venga rilevato alcun contatto, si procederà con la tecnica del playback, riproducendo un canto territoriale registrato, in modo che possa esser ascoltato a una distanza media di 300 m. Si alterneranno 3 serie di 1 minuto di stimolazione sonora seguito da 1 minuto di ascolto. L'orario di campionamento va dal tramonto alle due ore successive o dalle due ore precedenti l'alba.

Periodo di campionamento: Il periodo di campionamento è compreso tra dicembre e febbraio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per queste specie non è prevista l'individuazione di Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Devono essere previste visite a tutte le pareti rocciose che possono ospitare potenzialmente nidi della specie. Ogni parete visitata verrà considerata un plot, identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "BUB", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_BUB_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ciascuna parete va visitata fino a 2 volte nel periodo di campionamento, ad una distanza temporale compresa tra i 15 e i 20 giorni, fin quando non venga accertato l'eventuale utilizzo per la nidificazione.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione indica i siti di nidificazione, rappresentati come elementi puntiformi. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione di popolazione nel Sito, espressa come n° di coppie.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Il numero di pareti che si possono visitare in una giornata dipende dalla loro raggiungibilità e dalla distanza tra loro.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A224 *Caprimulgus europaeus*

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti. Questa specie può occupare habitat molto diversi tra loro, caratterizzati da vegetazione aperta ma ai margini di superfici boscate e/o agricole.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede l'ascolto dei maschi territoriali (Cadbury 1981, Gagliardi e Tosi 2012). Il rilevatore si posiziona al centro di un plot di campionamento per 5 minuti, in attesa di ascoltare il tipico richiamo territoriale del maschio. In caso che non venga rilevato alcun contatto, si procederà a riprodurre un canto territoriale registrato, in modo che possa esser ascoltato a una distanza media di 300 m. Si alterneranno 3 serie di 1 minuto di stimolazione sonora seguito da 1 minuto di ascolto. Il campionamento viene effettuato nell'arco delle due ore a cavallo del tramonto.

Periodo di campionamento Il periodo di campionamento è compreso tra il 1 giugno e il 15 luglio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: L'area di distribuzione potenziale viene divisa in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), all'interno delle quali si sceglieranno plot, eventualmente lungo un transetto, distanti tra loro almeno 500 m. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "CAP", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CAP_PTD_001). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "CAP", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CAP_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ogni plot va visitato 2 volte in giorni diversi nel periodo di campionamento, ad una distanza temporale compresa tra i 15 e i 20 giorni, avendo cura che almeno una delle due visite sia nel mese di giugno.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie nei plot viene attribuita a tutta la PTD in cui il plot ricade. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo permette di individuare fino al 75% dei maschi presenti in un'unica sessione di campionamento (Cadbury 1981). Il metodo porta a stime quantitative di densità calcolate con il metodo dei FCP o dei VCP : $n^{\circ} \text{ coppie} / \text{kmq}$. Il calcolo della densità viene eseguito per ciascuna PTD, utilizzando il numero massimo di osservazioni fatte in ciascun plot confrontando le due repliche. La stima della popolazione viene eseguita moltiplicando la densità in ciascuna PTD per la sua superficie. La popolazione del Sito viene calcolata sommando le stime ottenute nelle diverse PTD.

Impegno umano: Ogni notte si possono visitare fino a 5 plot.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A024 Ardeola ralloides

A026 Egretta garzetta

A023 Nycticorax nycticorax

A032 Plegadis falcinellus

Note: Il campionamento è riferito alle colonie nidificanti (garzaie).

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto delle colonie riproduttive (Gagliardi e Tosi 2012). Le colonie vanno cercate in tutti gli ambienti idonei, percorrendo le zone boscate ai margini di zone umide, dove è segnalata la presenza. Una volta individuata la colonia si identifica la specie e si stima il numero di nidi attivi aiutandosi con un binocolo o un cannocchiale, durante le ore centrali del giorno, quando gli adulti sostano al nido.

Periodo di campionamento: Da maggio a giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per queste specie non è prevista l'identificazione di Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Si visiteranno tutte le aree ritenute idonee dal punto di vista ambientale alla ricerca delle garzaie. Ogni garzaia verrà registrata come se fosse un plot, identificandola con un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "GAR", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_GAR_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Ardeidi).

Frequenza temporale: Ogni area ritenuta idonea va visitata fino a 3 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento, fin quando non venga accertata l'eventuale presenza di colonie.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione indica l'ubicazione delle colonie, distinte per specie, rappresentate come elementi puntiformi. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come *n° di nidi attivi*. Il calcolo viene eseguito per ciascuna colonia. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole colonie.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate tutte le aree di un Sito e, se di piccole dimensioni, anche più Siti.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A029 Ardea purpurea

Note: Il campionamento è riferito alle popolazioni nidificanti.

Metodo di campionamento: Nidifica in piccoli gruppi con nidi nascosti nel canneto; il metodo prevede il campionamento diretto di tali gruppi attraverso la ricerca dei giovani appena involati (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilievo viene eseguito da transetti o punti di osservazione in prossimità di zone umide potenzialmente interessate. L'avvenuta riproduzione è testimoniata dalla presenza di giovani involati. Il rilievo si esegue durante le prime ore del mattino.

Periodo di campionamento: Da giugno ai primi di luglio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Le zone umide di potenziale presenza devono essere visitate in modo da riuscire a osservare tutte le aree idonee (Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale : PTD). Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "ARP", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_ARP_PTD_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Ardeidi).

Frequenza temporale: Ogni area va visitata fino a 3 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento, due volte a giugno e una a luglio, fin quando non venga confermata l'eventuale presenza di coppie riproduttive.

Stima della dimensione della popolazione. La carta di distribuzione indica le PTD in cui è accertata la nidificazione. La carta è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come n° di gruppi in nidificazione. Il calcolo viene eseguito per ciascuna PTD. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle PTD.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate tutte le aree di un Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A022 *Ixobrychus minutus*

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto mediante ascolto e osservazione in plot ubicati in prossimità di aree con idonea vegetazione (Gagliardi e Tosi 2012). In ogni plot il rilevatore sosta 20 minuti in attesa di ascoltare il canto territoriale o osservare la presenza di individui. Degli individui osservati occorre annotare anche il sesso. Il rilievo si esegue durante le due ore successive all'alba.

Periodo di campionamento: giugno, preferendo la concentrazione dei rilievi nella seconda decade del mese.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Nelle zone umide di potenziale presenza delle specie si individuano le aree con habitat idoneo, dividendole in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), all'interno delle quali si individuano plot a distanza di circa 200 m l'uno dall'altro. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "IXO", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_IXO_PTD_001). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "IXO", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_IXO_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ogni plot va visitato 2 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie in un plot si attribuisce all'intera PTD in cui ricade. La carta è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come *n° di coppie*. Il calcolo viene eseguito per ciascuna PTD. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole PTD.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In una giornata (2 ore) si possono visitare circa 4-5 plot.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A060 *Aythya nyroca*

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti. Durante i campionamenti si registrerà la presenza anche di altre specie di Anatidi e uccelli acquatici eventualmente presenti negli specchi d'acqua in cui si esegue il campionamento.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto delle coppie nidificanti (Gagliardi e Tosi 2012). Il rilievo viene eseguito da punti di osservazione dalla riva delle zone umide potenzialmente interessate. L'avvenuta riproduzione è testimoniata dalla presenza di nidi o di pulcini. Il rilievo si esegue durante le prime ore del mattino.

Periodo di campionamento: Da maggio a giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Le zone umide di potenziale presenza devono essere visitate ubicando una serie di plot in modo da riuscire a osservare tutte le aree idonee; ad ogni plot, pertanto, viene associata un'area che viene rilevata (Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale : PTD). Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "AYT", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_AYT_PTD_001). Non è necessario creare un archivio vettoriale dei Plot. Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (*Aythya*).

Frequenza temporale: Ogni plot va visitato fino a 3 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione. La carta di distribuzione indica le PTD in cui è stata accertata la presenza dei nidi, o dei pulcini in acqua a seguito del genitore. La carta è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come *n° di coppie*. Il calcolo viene eseguito per ciascuna PTD. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole aree.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. Ogni giornata di campionamento possono essere visitate tutte le aree di un Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A135 Glareola pratincola

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti.

Metodo di campionamento: Il metodo prevede il campionamento diretto da transetto alla ricerca di siti di riproduzione (Kovács e Kapocsi 2005). In ogni sito di riproduzione si conteggiano gli individui in cova o i nidi, tenendosi a debita distanza, con l'ausilio di un binocolo o un cannocchiale. Il rilievo si può eseguire in qualunque momento del giorno dall'alba al tramonto.

Periodo di campionamento: Dal 15 Maggio al 15 Giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Nelle zone umide di potenziale presenza delle specie si individuano le aree con habitat idoneo, dividendole in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), all'interno delle quali si percorrono transetti alla ricerca delle zone di riproduzione. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "GLA", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_GLA_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "GLA", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_GLA_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_transetto).

Frequenza temporale: Ogni transetto va visitato 2 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali, corrispondenti alle PTD in cui è stata accertata la presenza. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come *n° di coppie*. Il calcolo viene eseguito per ciascuna PTD. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole PTD.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In una giornata si possono visitare tutti i transetti di un Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A181 Larus audouinii

Note: Il campionamento è riferito alle colonie nidificanti. Durante i campionamenti si registrerà la presenza anche di altre specie di laridi nidificanti eventualmente rilevate.

Metodo di campionamento : Il metodo prevede il campionamento diretto alla ricerca di siti di riproduzione (Cortes *et al.* 2005). In ogni sito di riproduzione si conteggiano gli individui in cova o i nidi, tenendosi a debita distanza, con l'ausilio di un binocolo o un cannocchiale. Il rilievo si può eseguire in qualunque momento del giorno dall'alba al tramonto.

Periodo di campionamento: Dal 15 Maggio al 15 Giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per questa specie non è necessario individuare le Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Tutte le aree ritenute idonee andranno visitate alla ricerca di colonie. Una volta trovate, le colonie vengono osservate a distanza per cercare di contare le coppie nidificanti. Ogni colonia verrà registrata come se fosse un plot, identificandola con un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "LAR", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_LAR_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ogni area ritenuta idonea va visitata 2 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata da elementi puntiformi, corrispondenti ai siti di ubicazione delle colonie (centroide). Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come n° di coppie. Il calcolo viene eseguito per ciascuna colonia. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole colonie.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In una giornata si possono visitare tutti i transetti di un Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A392 Phalacrocorax aristotelis

A875 Microcarbo pygmaeus

Note: Il campionamento è riferito alle colonie nidificanti.

Metodo di campionamento : Il metodo prevede il campionamento diretto alla ricerca di siti di riproduzione (La Mesa *et al.* 2019).

In ogni sito di riproduzione si conteggiano gli individui in cova o i nidi, tenendosi a debita distanza, con l'ausilio di un binocolo o un cannocchiale. Il rilievo si può eseguire in qualunque momento del giorno dall'alba al tramonto.

Periodo di campionamento: Da Marzo a Maggio.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Per questa specie non è necessario individuare le Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD). Tutte le aree ritenute idonee andranno visitate alla ricerca di colonie. Una volta trovate, le colonie vengono osservate a distanza per cercare di contare le coppie nidificanti. Ogni colonia verrà registrata come se fosse un plot, identificandola con un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "PHA", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_PHA_P_001 o REGNA_MYC_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ogni area ritenuta idonea va visitata 2 volte, in giorni diversi distribuiti il primo a fine marzo e il secondo tra fine aprile e .

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata da elementi puntiformi, corrispondenti ai siti di ubicazione delle colonie (centroide). Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come n° di coppie. Il calcolo viene eseguito per ciascuna colonia. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole colonie.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In una giornata si possono visitare tutti i transetti di un Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A138 *Charadrius alexandrinus*

Note: Il campionamento è riferito alla popolazione nidificante. Durante i campionamenti si registrerà la presenza anche di altre specie di Caradriformi nidificanti eventualmente rilevate.

Metodo di campionamento : Il metodo prevede il campionamento diretto da transetto dei nidi, dei genitori in cova o dei pulcini al nido. In ogni sito di riproduzione si cercano e si conteggiano gli individui in cova, i nidi o i pulcini al nido, tenendosi a debita distanza, con l'ausilio di un binocolo o un cannocchiale. La presenza di una coppia riproduttiva è data dal rilievo di un nido, di pulcini o di adulti in comportamento di difesa con emissione del tipico canto "*thurwheit*" (Warriner *et al.* 1986). Il rilievo si deve eseguire alle prime ore del mattino.

Periodo di campionamento: Dal 15 aprile al 15 giugno.

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Nelle zone costiere di potenziale presenza delle specie si eseguono rilievi lungo transetti alla ricerca delle zone di riproduzione. Ogni transetto è riferito ad una porzione della spiaggia, trattata come Porzione di Territorio di Distribuzione (PTD). I transetti percorrono la spiaggia parallelamente alla linea di battigia. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "CHA", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CHA_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "CHA", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_CHA_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_transetto).

Frequenza temporale: Ogni transetto va visitato 3 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali, corrispondenti alle PTD in cui è stata accertata la presenza. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come n° di coppie. Il calcolo viene eseguito per ciascuna PTD. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole PTD.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In una giornata si possono visitare tutti i transetti di un Sito.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

A131 Himantopus himantopus

Note: Il campionamento è riferito alle coppie nidificanti.

Metodo di campionamento : Il metodo prevede il campionamento diretto da transetto alla ricerca di siti di riproduzione (Gagliardi e Tosi 2012). In ogni sito di riproduzione si conteggiano gli individui in cova o i nidi, tenendosi a debita distanza, con l'ausilio di un binocolo o un cannocchiale. Il rilievo si può eseguire in qualunque momento del giorno dall'alba al tramonto.

Periodo di campionamento: Dal 1 Maggio al 30 Giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Nelle zone umide di potenziale presenza delle specie si individuano le aree con habitat idoneo, dividendole in Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD), all'interno delle quali si percorrono transetti alla ricerca di individui in cova o nidi. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "HIM", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_HIM_PTD_001). Ogni transetto verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "HIM", dal trattino "underscore", dalla sigla "T", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_HIM_T_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_transetto).

Frequenza temporale: Ogni transetto va visitato 3 volte, in giorni diversi distribuiti opportunamente nel periodo di campionamento.

Impegno umano: È sufficiente un solo operatore senior. In una giornata si possono visitare tutti i transetti di un Sito.

Stima della dimensione della popolazione: La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali, corrispondenti alle PTD in cui è stata accertata la presenza. Il metodo porta alla stima quantitativa della dimensione della popolazione, espressa come *n° di coppie*. Il calcolo viene eseguito per ciascuna PTD. La stima della popolazione nel Sito è calcolata sommando i valori delle singole PTD.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Uccelli Passeriformi

Note: Il campionamento è riferito alle specie di passeriformi all. I della Direttiva Uccelli che presentano popolazione nidificante. Durante i campionamenti si registrerà la presenza anche di altre specie di passeriformi eventualmente osservate.

Metodo di campionamento: Il monitoraggio delle popolazioni nidificanti si effettua mediante rilievi puntiformi in plot d'ascolto con la tecnica dei *Variable Circular Points* (Reynolds *et al.* 1980) o dei *Fixed Circular Points* (Hutto *et al.* 1986). Si tratta di un metodo quali-quantitativo che prevede l'individuazione delle specie nidificanti nell'area di indagine, osservando gli adulti territoriali o ascoltando i loro canti da un numero adeguato di punti di ascolto. L'osservatore resta in ogni punto di ascolto un tempo variabile dai 10 ai 20 minuti, secondo la quantità di nuovi dati che riesce a registrare rimanendo più tempo. Si può considerare sufficiente un tempo di 10 minuti in modo da effettuare un maggior numero di plot, a parità di ore di campionamento, guadagnando in termini di probabilità di rilevare una specie. Il campionamento deve essere evitato quando sussistono situazioni di disturbo che ostacolano la visibilità o l'ascolto, o che possano determinare una scarsa attività degli uccelli quali, a titolo di esempio, pioggia fitta, vento forte, rumori, ecc. I rilievi devono essere condotti nelle quattro ore successive all'alba e nelle due ore antecedenti il tramonto. La principale assunzione del metodo consiste nel fatto che ogni individuo non venga conteggiato più di una volta, pertanto può essere utile schematizzare su carta la posizione degli individui rilevati, che in periodo riproduttivo sono territoriali, per ricordare meglio quali di essi siano stati già contati. Il metodo dei FCP prevede la registrazione solo degli animali osservati entro una distanza prefissata dall'osservatore. Il metodo VCP prevede la registrazione di tutti gli individui osservati indicando per ciascuno la distanza stimata dall'osservatore; sarà l'analisi statistica dei dati raccolti a determinare la distanza da considerare per il calcolo della densità, che può essere diversa secondo la specie (Reynolds *et al.* 1980).

Periodo di campionamento: Da 15 Aprile al 30 Giugno

Sforzo della sessione di monitoraggio

Frequenza spaziale: Una volta individuate le Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) per ciascuna specie, o loro gruppi in base a similarità di habitat, al loro interno si scelgono plot in numero rappresentativo delle superfici da campionare, in media 4 plot /kmq in caso di PTD dell'ordine di pochi kmq e 2 plot /kmq in caso di PTD con superfici maggiori di 10 kmq. Se l'areale si presenta frammentato come tessere di un mosaico all'interno del Sito, è necessario disporre almeno un plot per ciascuna tessera. In ogni caso, in un Sito non si dovrebbero avere meno di 10 plot, avendo cura di mantenere le stazioni distanti almeno 500 m l'una dall'altra per evitare di conteggiare più volte gli stessi individui. Ogni PTD verrà identificata da un codice di 17 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "XXX", dal trattino "underscore", dalla sigla "PTD", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_PAS_PTD_001). "XXX" è una sigla contenente lettere distintive del nome della specie, ad esempio per *Lanius collurio* "XXX" può essere "LCO" (prima X= prima lettera del genere, seconda e terza X=prime due lettere del nome specifico) e comunque va scelta in modo da non essere uguale alla sigla usata per altre specie, anche se diverse dagli uccelli passeriformi). Ogni plot verrà identificato da un codice di 15 caratteri alfanumerici composto dal nome del raggruppamento dei siti Natura 2000 seguito dal trattino "underscore", dalla sigla "PAS", dal trattino "underscore", dalla sigla "P", dal trattino "underscore" e da un numero progressivo di tre cifre (ad esempio: REGNA_PAS_P_001). Oltre ai dati di presenza della specie devono essere raccolte anche informazioni su eventuali minacce o pressioni riscontrate sulla specie, secondo la classificazione allegata. Per il campionamento su campo si utilizzerà la scheda allegata (Uccelli_plot).

Frequenza temporale: Ogni plot va eseguito 3 volte, una volta in ciascun mese di campionamento.

Stima della dimensione della popolazione: La presenza della specie nei plot viene attribuita all'intera PTD che rappresentano. La carta di distribuzione è rappresentata da elementi poligonali. Il metodo porta a stime quantitative di dimensione della popolazione, mediante il calcolo della densità : n° coppie / kmq, utilizzando il numero di maschi territoriali entro la distanza prefissata (FCP, Hutto *et al.* 1986) o calcolata statisticamente (VCP, Reynolds *et al.* 1980) e la superficie del cerchio descritto dal raggio pari a tale distanza. La stima viene effettuata per ciascuna PTD e la dimensione della popolazione (n° coppie nidificanti) viene stimata moltiplicando la densità in ciascuna PTD per la sua superficie. In ogni plot si considera presente una coppia qualora venga rilevata in almeno una delle repliche temporali. La popolazione del Sito viene calcolata sommando le stime delle diverse PTD.

Impegno umano: È sufficiente un operatore senior. In un giorno si campionano circa 20 plot.

Frequenza di monitoraggio: Ogni 6 anni

Tabella riassuntiva dei rilevamenti per mese (se indicato il gruppo di specie, consultare la scheda specie-specifica). I rilevamenti possono essere eseguiti in mesi diversi qualora condizioni locali o specifiche suggeriscano che siano più rappresentativi mesi diversi.

Taxon	Mese											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<i>Vertigo sp.</i>			x	x	x				x	x	x	
<i>Austropotamobius pallipes</i>							x	x				
Odonati				x	x	x	x	x	x			
<i>Osmoderma italicum</i>							x	x				
<i>Cucujus cinnaberinus</i>					x	x	x					
<i>Cerambyx cerdo</i>						x	x					
<i>Rosalia alpina</i>							x	x				
Lepidotteri Ropaloceri					x	x	x	x	x	x		
<i>Euplagia quadripunctaria</i>							x					
Pesci						x	x	x	x	x		
<i>Alosa fallax</i>				x	x	x						
<i>Salamandrina sp.</i>				x	x	x	x	x				
<i>Triturus carnifex</i>					x	x						
<i>Bombina pachypus</i>			x	x	x	x	x					
<i>Emys orbicularis</i>					x	x	x	x				
<i>Testudo hermanni</i>				x	x	x						
<i>Caretta caretta</i>					x	x	x	x	x			
<i>Elaphe quatuorlineata</i>					x	x						
Chiroterri	x	x			x	x	x	x	x	x	x	
<i>Canis lupus</i>	x	x	x					x	x			x
<i>Lutra lutra</i>						x	x	x	x			
Picidi				x	x							
<i>Alcedo atthis</i>					x	x						
<i>Alectoris graeca</i>				x	x							
<i>Aquila chrysaethos</i>		x	x	x								
<i>Bubo bubo</i>	x	x										x

	Mese											
Taxon	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<i>Caprimulgus europaeus</i>					X	X	X					
<i>Circaethos gallicus</i>					X	X						
<i>Falco sp.</i>		X	X	X								
<i>Milvus sp.</i>				X	X	X						
<i>Pernis apivorus</i>				X	X	X						
Ardeidi					X	X						
<i>Botaurus stellaris</i>			X	X								
<i>Ixobrychus minutus</i>						X						
<i>Aythya niroca</i>					X	X						
<i>Glareola pratincola</i>					X	X						
<i>Larus auduini</i>					X	X						
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>			X	X	X							
<i>Microcarbo pugmaeus</i>			X	X	X							
<i>Charadrius alexandrinus</i>				X	X	X						
<i>Himantopus himantopus</i>					X	X						
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>					X	X						
Passeriformi					X	X	X					

Conservazione e gestione dei dati

La Regione Campania, per assicurare l'attuazione degli obiettivi delle Direttive Habitat e Uccelli, ai sensi del comma 4 art. 1 del DPR 357/97 e succ.m.m.i., e per garantire l'adeguato utilizzo dei risultati del monitoraggio effettuato ai fini degli art. 11 e 17 della Direttiva Habitat e art. 12 della Direttiva Uccelli, provvede alla conservazione dei dati sulla distribuzione e sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di all. I, II, IV e V della Direttiva Habitat, delle specie di all. I della Direttiva Uccelli e delle popolazioni di uccelli migratori, garantendo la corretta fruibilità delle stesse da parte dei soggetti gestori dei Siti Natura 2000. I dati vengono conservati in un geodatabase la cui struttura viene descritta di seguito per ciascuna delle componenti oggetto di monitoraggio.

Tutti i dati sono georiferite secondo il sistema di coordinate UTM33N - WGS84 (EPSG:32633).

I dati sono di due tipi:

1. vettoriali: vengono usate per rappresentare elementi geografici georeferenziati e spaziali. Secondo la natura dell'oggetto geografico, possono essere costituiti da vettori poligonali, lineari o puntiformi. Gli elementi vettoriali digitalizzati in base alla fotointerpretazione saranno adattati alla loro posizione geografica rispetto agli elementi territoriali (strade, corsi d'acqua, infrastrutture, ecc.) rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale 1: 5.000, mantenendo il sistema di riferimento UTM33N - WGS84 (EPSG:32633). Gli elementi che si estendono al di fuori del perimetro dei Siti Natura 2000 devono essere rappresentati per intero, senza tagliarne la parte esterna. Gli archivi vettoriali vengono realizzati in formati shape, secondo la struttura prevista da ESRI nel *Shapefile Technical Description* (<https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>), che prevede i seguenti file obbligatori:

- .shp - il file che conserva le informazioni sugli elementi geografici (tipo, coordinate, ecc.);
- .shx - il file che conserva l'indice degli elementi;
- .dbf - il file che conserva gli attributi associati agli elementi

Inoltre, devono essere presenti anche i seguenti file facoltativi:

- .prj - il file che conserva le informazioni sul sistema di coordinate e proiezione
- .shp.xml - il file che conserva il metadato

La digitalizzazione dei file vettoriali può avvenire con software *open source* QGIS (<https://www.qgis.org/it/site/>). La digitalizzazione di elementi poligonali adiacenti deve evitare la replica della linea di adiacenza. Ad esempio, con il software QGIS, questo si ottiene abilitando la funzione "Evita intersezione" tra le "Opzioni di *snapping*", in modo che, digitalizzando un secondo poligono che si interseca con il primo, venga tagliato automaticamente il secondo lungo il bordo comune. La digitalizzazione di elementi poligonali in forma di "isola" all'interno di un primo elemento poligonale va rappresentata evitando che la superficie del secondo sia sovrapposta a quella del primo. Ad esempio, con il software QGIS ciò si ottiene digitalizzando un "buco" con la forma del secondo poligono all'interno del primo poligono (funzione "Aggiungi buco") e poi digitalizzare un secondo poligono in modo che sia più esteso del "buco" lasciando alla funzione "Evita intersezione" di riportare l'esatta forma al secondo poligono.

2. alfanumerici

Habitat

L'informazione sugli habitat è strutturata in archivi in cui si conservano dati georiferiti spaziali in formato vettoriale e alfanumerici. Gli elementi vettoriali e le tabelle alfanumeriche possono essere relazionate tra loro, direttamente attraverso campi di relazione, o indirettamente attraverso procedure di *geoprocessing* (ad es. funzioni di *point in polygon*) in ambito GIS.

Gli archivi vettoriali comprendono:

1. distribuzione degli Habitat

Gli archivi alfanumerici comprendono:

1. dati del campionamento floristico-vegetazionale
2. dati elaborati sullo stato di conservazione

Carta della distribuzione degli Habitat

La distribuzione degli Habitat è riportata sulla cartografia come elementi areali, lineari o puntuali, secondo il tipo di distribuzione, come indicato nei protocolli di campionamento Habitat-specifici.

Ogni elemento poligonale rappresenta un'area omogenea di presenza dell'Habitat.

Ogni elemento lineare rappresenta un'area omogenea per Habitat nel caso in cui lo sviluppo lineare dell'Habitat abbia un'ampiezza tale da non poter essere rappresentato alla scala indicata nel protocollo di campionamento sito-specifico; di seguito i valori minimi di ampiezza alle diverse scale indicate:

scala	ampiezza
1:10.000	20 m

1_5.000	10 m
1:2.000	5 m

Ogni elemento puntiforme rappresenta l'area occupata da Habitat con estensione puntiforme o talmente ridotta da non essere cartografabile alla scala indicata, come previsto dal protocollo di campionamento habitat-specifico.

Gli elementi che rappresentano un habitat non possono essere sovrapposti tra loro (non è ammesso un poligono, linea o punto sovrapposto ad un altro poligono, linea o punto classificato con lo stesso habitat).

Allo stesso modo non è ammesso che si sovrappongano poligoni classificati con habitat diversi, così per le linee e i punti. In pratica, una porzione di territorio può essere classificata solo con un tipo di habitat.

Qualora una porzione di territorio comprenda più tipi di habitat distribuiti a mosaico, dove non sia possibile distinguere gli areali dei diversi tipi e non sia possibile rappresentarli con modelli diversi (ad esempio con punti), si dovrà duplicare il poligono/linea tante volte quanti sono i tipi di habitat a mosaico nel poligono/linea e classificare ogni poligono/linea con un tipo di habitat. La struttura del database permette di assegnare ad ogni poligono/linea sovrapposto (mosaico di habitat) un valore percentuale di copertura percentuale per ogni tipo di habitat presente; in mancanza di intervento da parte del compilatore, si assume una copertura percentuale equiripartita tra gli habitat del mosaico.

La shape degli elementi poligonali è denominata "Habitat_poligoni".

La shape degli elementi lineari sarà denominata "Habitat_linee".

La shape degli elementi puntiformi sarà denominata "Habitat_punti".

La distribuzione di ogni habitat può essere ripartita in più tipi di shape (ad esempio in poligoni e linee, o poligoni e punti) ed è

Le shape sono scaricabili dal portale Natura 2000 della Regione Campania dove viene aggiornata periodicamente anche la struttura del database. Sono inoltre visualizzabili e consultabili sul portale WEBGIS.

Dati del campionamento floristico-vegetazionale

I dati raccolti in campo attraverso i rilievi floristico-vegetazionali, sono gestiti in modo da consentire la consultazione dei rilievi eseguiti in campo e la loro elaborazione (realizzazione di matrici necessarie per l'analisi vegetazionale, l'analisi dei dati floristici, l'elaborazione dei dati demografici, la stampa delle etichette che dovranno accompagnare i campioni raccolti).

In particolare, la banca dati contiene i dati tassonomici relativi alle specie osservate e/o raccolte secondo la nomenclatura corrente (Bartolucci *et al.* 2018; Galasso *et al.* 2018), forma biologica e gruppo corologico (Pignatti 1982; endemismo secondo Peruzzi *et al.* 2014 e successivi aggiornamenti), *policy species* (Rossi *et al.* 2013). Per ogni entità rilevata sono indicati il dato distributivo regionale secondo Bartolucci *et al.* 2018 e Galasso *et al.* 2018, l'eventuale inclusione nella Legge Regionale 40/94 e nelle Liste Rosse della Flora Italiana (Conti *et al.* 2013, 2020). Tutti i dati di ogni rilevamento sono inclusi in un'apposita tabella, utilizzando un codice composto dalla sigla dell'obiettivo del rilievo (P per specie vegetali; H per Habitat), dell'aggruppamento territoriale cui il Sito appartiene, il numero progressivo di realizzazione; la tabella contiene tutti i dati previsti nella testata della scheda di rilevamento e le osservazioni riguardanti pressioni/minacce eventualmente presenti nel luogo di rilevamento. Ogni specie osservata e/o raccolta è relazionata ai rilevamenti in cui compare e caratterizzata dalle informazioni relative al valore di copertura e tipologia di campionamento (osservazione/campione d'erbario/fotografia). Nella banca dati è disponibile, inoltre, la tabella relativa alle minacce/pressioni secondo la codifica ufficiale prevista dalla Commissione Europea (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17).

La banca dati è consultabile dal portale Natura 2000 della Regione Campania dove viene aggiornata periodicamente anche la struttura del database. E' inoltre visualizzabile e consultabile sul portale WEBGIS.

Dati elaborati per Sito Natura 2000

I dati elaborati vengono utilizzati per la descrizione dei formulari standard dei Siti Natura 2000 consultabili sul portale Natura 2000 della Regione Campania.

Specie vegetali

I dati floristici comprendono quelli raccolti con le metodologie descritte nei capitoli precedenti.

I dati sono strutturati in formato vettoriale e alfanumerici georiferiti e relazionati tra loro, direttamente attraverso campi di relazione o indirettamente attraverso procedure di *geoprocessing* (ad es. funzioni di *point in polygon*) in ambito GIS.

I dati vettoriali comprendono:

1. distribuzione delle specie vegetali

Quelli alfanumerici comprendono:

1. dati del campionamento floristico-vegetazionale

2. dati elaborati sullo stato di conservazione

Carta della distribuzione delle specie vegetali

La distribuzione delle specie è riportata come elementi puntiformi, come indicato nei protocolli di campionamento specie-specifici. La carta è rappresentata in formato shape. Le shape sono scaricabili dal portale Natura 2000 della Regione Campania dove viene aggiornata periodicamente anche la struttura del database. E' inoltre visualizzabile e consultabile sul portale WEBGIS. Ogni specie sarà rappresentata con una shape, denominata con il nome latino della specie.

Dati del campionamento floristico-vegetazionale

La banca dati floristico-vegetazionale è stata descritta nella sezione relativa agli Habitat.

Dati elaborati per Sito Natura 2000

I dati elaborati vengono utilizzati per la descrizione dei formulari standard dei Siti Natura 2000, consultabili sul portale Natura 2000 della Regione Campania.

Specie animali

La banca dati faunistica comprende dati raccolti con le metodologie descritte nei capitoli precedenti sulla fauna di all. II, IV e V della Direttiva Habitat, di all. I della Direttiva Uccelli e sulle altre popolazioni di uccelli, sia all'interno, che all'esterno dei Siti Natura 2000.

La banca dati è strutturata in archivi in cui si conservano dati spaziali georiferiti in formato vettoriale e dati alfanumerici georiferiti. La banca dati ha una struttura in cui elementi vettoriali e tabelle alfanumeriche possono essere relazionate tra loro, direttamente attraverso campi di relazione, o indirettamente attraverso procedure di *geoprocessing* (ad es. funzioni di *point in polygon*) in ambito GIS.

Gli archivi vettoriali comprendono:

1. Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD)
2. Unità di campionamento

Gli archivi alfanumerici comprendono:

1. schede di campionamento faunistico
2. dati elaborati sullo stato di conservazione

Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD)

Sono archivi specie specifici, in cui vengono conservate le Porzioni del Territorio di Distribuzione Potenziale (PTD) utilizzate per posizionare le unità di campionamento durante le indagini di campo previste dal monitoraggio.

L'archivio delle PTD è di tipo vettoriale e, secondo la specie, può contenere poligoni o linee.

Ogni elemento poligonale rappresenta un'area omogenea del territorio di potenziale presenza della specie, perché considerato idoneo in base alle caratteristiche ambientali.

Ogni elemento lineare rappresenta un'area non cartografabile come un poligono in base alla scala utilizzata, ad esempio la riva di un fiume.

Le PTD dovranno essere digitalizzate in formato shape.

Gli elementi poligonali di una stessa specie non possono essere sovrapposti tra loro (non è ammesso un poligono sovrapposto ad un altro poligono relativo alla medesima specie).

Gli elementi lineari di una stessa specie non possono essere sovrapposti tra loro (non è ammessa una linea sovrapposta ad un'altra linea relativo alla medesima specie).

Per ciascuna specie le PTD identificate in anni successivi di monitoraggio potranno essere diverse, se cambia la distribuzione del loro habitat, in tal caso saranno diversi gli archivi shape che le descrivono. Qualora alcune PTD non dovessero subire modifiche negli anni, si utilizzeranno le funzioni per copiare gli elementi spaziali da una shape (l'anno precedente) ad un'altra (l'anno successivo) per evitare che una nuova digitalizzazione del medesimo elemento spaziale porti differenze dovute esclusivamente a differenze manuali di digitalizzazione, che creerebbero artefatti di falsi poligoni in caso di sovrapposizione spaziale delle PTD di due diversi anni di monitoraggio.

La distribuzione di ogni specie è rappresentata da un insieme di PTD che, rappresentando l'areale potenziale, comprendono le seguenti casistiche:

- PTD dove la specie è attualmente presente; vengono identificate con un valore positivo di dimensione di popolazione
- PTD dove, pur riscontrandosi habitat idoneo, la specie è assente; vengono identificate con una dimensione di popolazione pari a 0 (zero)
- PTD dove, pur riscontrandosi habitat idoneo, non è stato eseguito alcun rilievo di monitoraggio, pertanto, non è noto se la specie sia presente o assente; vengono identificate con un valore di dimensione di popolazione non numerico (nullo o lasciato vuoto)

Le carte di distribuzione delle specie sono conservate insieme in un'unica shape nella quale le PTD delle diverse specie sono distinguibili tra loro attraverso il codice della specie.

PTD poligonali

Sono rappresentate in shape poligonali le PDT dei seguenti *taxa*:

Invertebrati - *Vertigo* sp.pl.
Invertebrati - Coleotteri
Invertebrati - Lepidotteri
Rettili *Testudo hermanni*
Rettili - *Elaphe quatuorlineata*
Mammiferi - *Canis lupus*
Uccelli, picidi (distinguendo le diverse specie)
Uccelli - *Alcecoris graeca*
Uccelli, *Circaethos gallicus*
Uccelli, *Milvus milvus*
Uccelli, *Milvus migrans*
Uccelli, *Pernis apivorus*
Uccelli, *Caprimulgus europaeus*
Uccelli, *Ardea purpurea*
Uccelli, *Ixobrychus minutus*
Uccelli, *Aythya niroca*
Uccelli, *Glareaola pratincola*
Uccelli, *Charadrius alexandrinus*
Uccelli, *Himantopus himantopus*
Uccelli, passeriformi

PTD lineari

Sono rappresentate in shape lineari le PDT dei seguenti *taxa*:

Invertebrati - Crostacei
Invertebrati - Odonati
Ittiofauna
Rettili *Emys orbicularis*
Mammiferi - *Lutra lutra*
Uccelli - *Alcedo atthis*

Specie senza PTD

Per i monitoraggi in cui non si prevede l'individuazione di PTD, si tratteranno i siti visitati come fossero PTD, archiviando i dati in una shape di tipo puntiforme (gli elementi sono gli stessi di quelli previsti per l'archiviazione delle unità di campionamento; cfr. di seguito).

In questo caso i plot rappresentati nelle carte sono solo quelli in cui è stata rilevata la specie, mentre non sono riportati quelli in cui la specie è assente. Per conoscere i plot visitati basta consultare la carta delle unità di campionamento (cfr. paragrafo successivo).

Le specie per cui non si prevedono PTD sono:

Anfibi
Rettili *Caretta caretta*
Mammiferi, Chiroteri
Uccelli, *Aquila chrysaethos*, *Falco* sp.pl., *Pyrocorax pyrocorax*
Uccelli, *Bubo bubo*
Uccelli, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Plegadis falcinellus*
Uccelli, *Larus audouinii*, *Phalacrocorax aristotelis*, *Microcarbo pygmaeus*

Le shape sono scaricabili dal portale Natura 2000 della Regione Campania dove viene aggiornata periodicamente anche la struttura del database. Sono inoltre visualizzabili e consultabili sul portale WEBGIS.

Unità di campionamento

Ogni unità di campionamento (transetto, plot, stazione di campionamento) deve essere rappresentata con file in formato shape.

La georeferenziazione delle unità di campionamento può essere eseguita con qualunque sistema, compreso il rilievo su campo con GPS; tuttavia, al momento della realizzazione dei file shape, gli elementi vettoriali saranno adattati alla loro posizione geografica rispetto agli elementi territoriali (strade, corsi d'acqua, infrastrutture, ecc.) rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale 1:5.000, mantenendo il sistema di riferimento UTM 33 - WGS84 (EPSG:32633).

Inoltre, si avrà cura che gli elementi siano congruenti ai bordi delle PTD in cui ricadono; ad esempio, un transetto o dei plot che ricadono lungo una PTD rappresentata in maniera lineare, devono coincidere perfettamente al suo contorno. A tal fine si possono usare le funzioni dei software utilizzati per la digitalizzazione (*snap*, duplica, ecc.).

Transetti

Ogni insieme di transetti eseguiti per il campionamento di una specie (o gruppo di specie) in ciascun raggruppamento di Siti sarà rappresentato con una shape tipo linea.

Plot

Ogni insieme di plot eseguiti per il campionamento di un gruppo di specie in ciascun raggruppamento di Siti sarà rappresentato con una shape di tipo punti.

Le shape sono scaricabili dal portale Natura 2000 della Regione Campania dove viene aggiornata periodicamente anche la struttura del database. Sono inoltre visualizzabili e consultabili sul portale WEBGIS.

Dati del campionamento faunistico

I dati raccolti durante i rilievi, temporaneamente riportati sulle schede di campo allegate, vengono conservati in archivi alfanumerici costituiti da tabelle

La banca dati è consultabile dal portale Natura 2000 della Regione Campania dove viene aggiornata periodicamente anche la struttura del database. E' inoltre visualizzabile e consultabile sul portale WEBGIS.

Dati elaborati per Sito Natura 2000

I dati elaborati vengono utilizzati per la descrizione dei formulari standard dei Siti Natura 2000, consultabili sul portale Natura 2000 della Regione Campania.

Aggiornamento dei dati

La Regione Campania aggiorna periodicamente i dati sulla base dei risultati del monitoraggio. Poiché il monitoraggio, in particolare quello di secondo livello, è competenza anche dei soggetti gestori dei Siti, la Regione renderà possibile l'aggiornamento della banca dati da parte dei soggetti gestori attivando procedure specifiche che saranno comunicate appena disponibili.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. 2005. Il Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 (consultabile on line sul sito: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf)
- Amedei L. 2012. Cap. IV - Preparare i campioni raccolti. In Taffetani F.(ed.): Herbaria. Il grande libro degli erbari italiani. Per la ricerca tassonomica, la conoscenza ambientale e la conservazione del patrimonio naturale. Nardini Editore, Firenze. Pp. 73-89
- Angelini P., Casella L., Grignetti A. e Genovesi P. (ed.) 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142/2016.
- APAT 2007. Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei sistemi lotici. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, APAT, Università "Tor Vergata" - Roma, ICRAM, 31pp.
- Audisio P., Brustel H., Carpaneto G.M., Coletti G., Mancini E., Trizzino M., Antonini G., e De Biase A. 2009. Data on molecular taxonomy and genetic diversification of the European Hermit beetles, a species complex of endangered insects (Coleoptera: *Scarabaeidae*, *Cetoniinae*, *Osmoderma*) . Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 47: 88-95.
- Bakaloudis D. E., Vlachos C. G. e Holloway G. J. 2005. Nest spacing and breeding performance in Short-toed Eagle *Circus gallicus* in northeast Greece. Bird Study 52: 330-338
- Bartolucci F., Peruzzi L., Galasso G., Albano A., Alessandrini A., Ardenghi N.M.G., Astuti G., Bacchetta G., Ballelli S., Banfi E., Barberis G., Bernardo L., Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Di Pietro R., Domina G., Fascetti S., Fenu G., Festi F., Foggi B., Gallo L., Gubellini L., Gottschlich G., Guiggi A., Iamónico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Martinetto E., Masin R.R., Medagli P., Passalacqua N.G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Poldini L., Prosser F., Raimondo F.M., Marchetti D., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna A., Selvaggi A., Selvi F., Soldano A., Stinca A., Wagensommer R.P., Wilhalm T. e Conti F. 2018. An updated checklist of the vascular flora native to Italy. Plant Biosystem, 152(2): 179-303. DOI: 10.1080/11263504.2017.1419996
- Bernard Laurent A. e Laurent J.L. 1984 - Méthode de recensement de perdrix bartavelle (*Alectoris gaeca saxatilis*) au printemps: applications dans les Alpes Maritimes. Gibier Faune Sauvage.4: 69-85.
- Biondi E. e Blasi C. 2011, Manuale Italiano per l'Interpretazione degli Habitat - Direttiva 92/43/CEE. <http://www.minambiente.it/pagina/il-manuale-di-interpretazione-degli-Habitat>.
- Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Springer, Wien, 865 pp
- Buckland, S. T., Anderson, D. R., Burnham, K. P. and Laake, J. L. 1993. Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations. London: Chapman and Hall.
- Cadbury C.J. 1981. Nightjar census methods. Bird Study 28: 1-4.
- Chiari S., Carpaneto G.M., Zauli A., Marini L., Audisio P. e Ranius T. 2012. Habitat of an endangered saproxylic beetle, *Osmoderma eremita*, in Mediterranean woodlands . Ecoscience, 19(4): 299-307.
- Chiari S., Zauli A., Mazziotta A., Luiselli L., Audisio P. e Carpaneto G.M. 2013. Surveying an endangered saproxylic beetle, *Osmoderma eremita*, in Mediterranean woodlands: a comparison between different capture methods . Journal of insect conservation, 17(1): 171-181.
- Ciucci P. e Boitani L. 2010. Monitoraggio del lupo tramite conta delle tracce su neve: criteri, limiti e condizioni di impiego. In (Caniglia R., E. Fabbri, C. Greco & E. Randi, eds.): Ricerca scientifica e strategie per la conservazione del lupo (*Canis lupus*) in Italia. Quaderni di Conservazione della Natura 33, Ministero Ambiente - ISPRA: 67-89.
- Cortes J., Shaw E., Blair M. e Candelin G. 2005. The control of the Yellow-legged Gull *Larus cachinnans* in Gibraltar. Almoraima, 31: 199-216.
- DG Environment. 2017. Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018. Brussels. Pp 188
- Emlen J.T. 1971. Estimating Breeding Season Bird Densities from Transect Counts. Auk 94:455-468.
- Ercole S., Giacanelli V., Bacchetta G., Fenu G. e Genovesi P. (eds.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie vegetali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 140/2016.
- Evans D. e Arvela M. 2011. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012. European Topic Centre on Biological Diversity.
- Frattaroli A.R., e Console C. 2016. Box 7: Habitat forestali: Analisi dendrometriche. In Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e Habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142/2016, p. 22.
- Gagliardi A. e Tosi G. (a cura di) 2012. Monitoraggio di Uccelli e Mammiferi in Lombardia. Tecniche e metodi di rilevamento. Regione Lombardia, Università degli Studi dell'Insubria, Istituto Oikos.
- Galasso G., Conti F., Peruzzi L., Ardenghi N. M. G., Banfi E., Celesti-Grapow L., Albano A., Alessandrini A., Bacchetta G., Ballelli S., Bandini Mazzanti M., Barberis G., Bernardo L., Blasi C., Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Gallo L., Gubellini L., Guiggi A., Iamónico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Marchetti D., Martinetto E., Masin R. R., Medagli P., Passalacqua N. G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Podda L., Poldini L.,

- Prosser F., Raimondo F. M., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna S., Selvaggi A., Selvi F., Soldano A., Stinca A., Wagensommer R. P., Wilhelm T., Bartolucci F., 2018. An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. *Plant Biosystem*, 152(3): 556-592. DOI: 10.1080/11263504.2018.1441197.
- Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F. e Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014
- Gigante D., Attorre F. e Venanzoni R. 2016. Note metodologiche ai protocolli di monitoraggio. In Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142/2016, pp. 12-14.
- Greig-Smith P. 1983. Quantitative plant ecology. *Studies in Ecology*, vol. 9, 3rd ed. Blackwell, Oxford.
- Hutto R. L., Pletschet S.M. e Hendricks P. 1986. A fixed-radius point count method for nonbreeding and breeding season use. *Auk* 103: 593-602.
- Kennedy, K.A. e Addison P.A. 1987. Some considerations for the use of visual estimates of plant cover in biomonitoring. *Journal of Ecology* 75: 151-157.
- Kent M. e Coker P. 1992. Vegetation description and analysis. A practical approach. John Wiley & Sons.
- Kovács G. e Kapocsi I. 2005. Székicsér (*Glareola pratincola*) [Collared Pratincole (*Glareola pratincola*)]. In: Ecsedi, Z. (szerk.) A Hortobágy madárvilága [Birds of Hortobágy]. – Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 272-276.
- La Mesa G., Paglialonga A., Tunesi L. (ed.), 2019. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia: ambiente marino. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 190/2019.
- McGarigal, K., Cushman S.A., Neel M.C. e Ene E. 2002. FRAGSTATS v3: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst. <http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html>
- Marion W.R., O'Meara T.E. e Maehr D.S. 1981. Use of playback recordings in sampling elusive or secretive birds. *Stud. Avian. Biol.* 6: 137-147.
- Marucco F. (a cura di) 2014. Strategia, metodi e criteri per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi italiane . Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 WOLFALPS – Azione A2, 60 pp.
- MASE 2014. Linee guida per le Regioni e Province Autonome in materia di monitoraggio. MASE, Roma.
- Mazzei A., Bonacci T., Contarini E., Zetto T. e Brandmayr P. 2011. Rediscovering the 'umbrella species' candidate *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763) in Southern Italy (Coleoptera Cucujidae), and notes on bionomy . *Italian Journal of Zoology*, 78(2): 264-270.
- Moggi G. 2012. Gli Erbari in Italia. In Taffetani F.(ed.): *Herbaria. Il grande libro degli erbari italiani*. Per la ricerca tassonomica, la conoscenza ambientale e la conservazione del patrimonio naturale. Nardini Editore, Firenze. Pp. 707-814
- Moorkens E.A. e Killeen I.J. 2011. Monitoring and Condition Assessment of Populations of *Vertigo geyeri*, *Vertigo angustior* and *Vertigo moulinsiana* in Ireland . *Irish Wildlife Manuals*, No. 55. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and Gaeltacht, Dublin, Ireland.
- Pollard E. e Yates T.J. 1993. Monitoring butterflies for ecology and conservation . Chapman and Hall, London, UK, 274 pp.
- Reuther C., Dolch D., Green R., Jahl J., Jefferies D.J., Krekemeyer A., Kucerova M., Madsen A.B., Romanowski J., Roche K., Ruiz-Olmo J., Teubner J. e Trindade A. 2000. Surveying and monitoring distribution and population trends of the Eurasian otter (*Lutra lutra*). Guidelines and evaluation of the Standard Method for surveys as recommended by the European section of the IUCN/SSCOtter Specialist Group, *Habitat* , 12: 1-152.
- Reynolds R. T., Scott J. M. e Nussbaum Ronald A. 1980. A variable circular-plot method for estimating bird numbers. *Condor* 82: 309-313.
- Reynolds J.D., O'Connor W., O'Keeffe C. e Lynn D. 2010. A technical manual for monitoring white-clawed crayfish *Austropotamobius pallipes* in Irish lakes . *Irish Wildlife Manuals*, 45, National Parks and Wildlife Service, Department of the Environment, Heritage and Local Government, Dublin, 23 pp.
- Romanowski J., Roche K., Ruiz-Olmo J., Teubner J. e Trindade A. 2000. Surveying and monitoring distribution and population trends of the Eurasian otter (*Lutra lutra*). Guidelines and evaluation of the Standard Method for surveys as recommended by the European section of the IUCN/SSCOtter Specialist Group, *Habitat* , 12: 1-152.
- Rossi G., Montagnani C., Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S., Cogoni A., Fenu G., Magrini S., Gennai M., Foggi B., Wagensommer R.P., Venturella G., Blasi C., Raimondo F.M., Orsenigo S. (Eds.), 2013. Lista Rossa della Flora Italiana. 1. *Policy Species* e altre specie minacciate. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rossi G., Orsenigo S., Gargano D., Montagnani C., Peruzzi L., Fenu G., Abeli T., Alessandrini, A., Astuti G., Bacchetta G., Bartolucci F., Bernardo L., Bovio M., Brullo S., Carta, A., Castello M., Cogoni D., Conti F., Domina G., Foggi B., Gennai M., Gigante D., Iberite, M., Lasen C., Magrini S., Nicoletta G., Pinna M.S., Poggio L., Prosser F., Santangelo A., Selvaggi A., Stinca A., Tartaglioni N., Troia A., Villani M.C., Wagensommer R.P., Wilhelm, T., Blasi C., 2020. Lista Rossa della Flora Italiana. 2 Endemiti e altre specie minacciate. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Sevilleja, C.G., van Swaay, C.A.M., Bourn, N., Collins, S., Settele, J., Warren, M.S., Wynhoff, I. and Roy, D.B. 2019. Butterfly Transect Counts: Manual to monitor butterflies. Report VS2019.016, Butterfly Conservation Europe & De Vlinderstichting/Dutch Butterfly Conservation, Wageningen.

- Stoch F. e Genovesi P. (ed.) 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016.
- Trizzino M., Audisio P., Bisi F., Bottacci A., Campanaro A., Carpaneto G.M., Chiari S., Hardersen S., Mason F., Nardi G., Preatoni D.G., Vigna Taglianti A., Zauli A., Zilli A. e Cerretti P. 2013. Gli artropodi italiani in Direttiva Habitat: biologia, ecologia, riconoscimento e monitoraggio . Quaderni Conservazione Habitat, 7. CFS-CNBFVR, Centro Nazionale Biodiversità Forestale. Cierre Grafica, Sommacampagna, Verona, 256 pp.
- Warriner J.S., Warriner J.C., Page G.W. e Stenzel L .E. 1986. Mating system and reproductive success of a small population of polygamous Sn owy Plovers. *Wilson Bull* 9. 8(1):1 5-37.
- Westhoff V. e Maarel E. 1978. The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker R.H. (ed.), *Classification of plant communities*. Junk, The Hague: 287-399
- White G.C. e Burnham K.P. 1999. Program MARK: survival estimation from populations of marked animals . *Bird Study* 46 Supplement: 120-138.

ALLEGATI

Schede di campo per i campionamenti degli Habitat



Piano di Monitoraggio della Rete Natura2000 in Campania

Habitat

Codice Sito Natura 2000: IT80_____

Rilevatore _____ Data - n. relev. _____ - _____

Località _____ Coordinate (WGS84 33T) _____/_____

Quota. m _____ Esposizione ° _____ Inclinazione ° _____

Tipo geolitologico _____ Rocciosità % _____ Pietrosità % _____

Uso del suolo _____

Copertura totale. % _____ Suolo nudo % _____ Lettieria % _____

A-Strato arboreo altezza media m _____ copertura. % _____

B-Strato arbustivo altezza media m _____ copertura. % _____

C-Strato erbaceo altezza media cm _____ copertura. % _____

Superficie rilevata (indicare i mq per plot quadrati o raggio in m per plot circolari) _____

Pressioni e importanza: _____

Composizione floristica, valori di copertura, erbario (e)/foto (f)

1			20			
2			21			
3			22			
4			23			
5			24			
6			25			
7			26			
8			27			
9			28			
10			29			
11			30			
12			31			
13			32			
14			33			
15			Scala per le coperture: 5 → 75 % <copertura<100% 4 → 50 % < copertura< 75 % 3 → 25 % < copertura< 50 % 2b → 12,5 % < copertura< 25 % 2a → 5 % < copertura< 12,5 % 1 → 1% < copertura <5% + → <1% r → rarissima (pochissimi individui)			
16						
17						
18						
19						

34			57			
35			58			
36			59			
37			60			
38			61			
39			62			
34			63			
35			64			
36			65			
37			66			
38			67			
39			68			
40			69			
41			70			
42			71			
43			72			
44			73			
45			74			
46			75			
47			76			
48			77			
49			78			
50			79			
51			Scala per le coperture: 5 → 75 % <copertura<100% 4 → 50 %< copertura< 75 % 3 → 25 %< copertura< 50 % 2b → 12,5 %< copertura< 25 % 2a → 5 %< copertura< 12,5 % 1 → 1%< copertura <5% + → <1% r → rarissima (pochissimi individui)			
52						
53						
54						
55						
56						

NOTE

Schede di campo per i campionamenti delle specie vegetali



Piano di Monitoraggio della Rete
Natura2000 in Campania

Scheda rilevamento Plants

Codice Sito Natura 2000: IT80_____

Rilevatore _____ Data - n. relev. _____ - _____

Località _____ Coordinate (WGS84 33T) _____/_____

Quota. m _____ Esposizione ° _____ Inclinazione ° _____

Tipo geolitologico _____ Rocciosità % _____ Pietrosità % _____

Uso del suolo _____

Copertura totale. % _____ Suolo nudo % _____ Lettieria % _____

A-Strato arboreo altezza media m _____ copertura. % _____

B-Strato arbustivo altezza media m _____ copertura. % _____

C-Strato erbaceo altezza media cm _____ copertura. % _____

Superficie rilevata mq _____

Specie

N° individui _____

N° individui in riproduzione _____

Produzione di semi/spore (s/n) _____

Plantule (s/n) _____ individui morti (s/n) _____

Riproduzione vegetativa (s/s) _____

Pressioni e importanza: _____

Composizione floristica, valori di copertura, erbario (e)/foto (f)

1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				Scala per le coperture: 5 → 75 % < copertura < 100 % 4 → 50 % < copertura < 75 % 3 → 25 % < copertura < 50 % 2b → 12,5 % < copertura < 25 % 2a → 5 % < copertura < 12,5 % 1 → 1% < copertura < 5% + → < 1% r → rarissima (pochissimi individui)			
15							
16							
17							
18							
32				55			

33			56		
34			57		
35			58		
36			59		
37			60		
38			61		
39			62		
40			63		
41			64		
42			65		
43			66		
44			67		
45			68		
46			69		
47			70		
48			71		
49			72		
50			73		
51			74		
52			75		
53			76		
54			77		

NOTE

In caso di presenza di più specie di Allegato riportare di seguito i risultati del rilievo demografico

Specie:

N° di individui _____

N° di individui in riproduzione (%) _____

Produzione di semi/spore (s/n) _____

Plantule (s/n) _____ individui morti (s/n) _____

Riproduzione vegetativa (s/n) _____

Specie:

N° di individui _____

N° di individui in riproduzione (%) _____

Produzione di semi/spore (s/n) _____

Plantule (s/n) _____ individui morti (s/n) _____

Riproduzione vegetativa (s/n) _____

Schede di campo per i campionamenti delle specie animali

ANFIBI: Scheda per il campionamento di *Anfibi*

Codice plot: _____ Rilevatore: _____

Coordinate UTM33T - WGS84 : longitudine (X) _____ latitudine (Y) _____

Data: _____ Ora di inizio : _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Età	Attività

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: uova, girino, subadulto, adulto

Attività: canto, accoppiamento, depone uova, prende il sole, sotto un rifugio

ARDEIDI : Scheda per il campionamento di *Ardeidi in Garzaie o Ardea purpurea*

Codice area: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero	nidi/gruppi	Coordinate UTM33T WGS84	
			X	Y

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: adulto, giovane, pulcino

Attività: comportamento territoriale, in alimentazione, in volo

AUSTROPOTAMOBIOUS : Scheda per il campionamento di *Austropotamobius pallipes*

Transetti in acque lentiche / lotiche (sottolineare la tipologia di habitat)

Codice transetto:_____Rilevatore:_____

Data:_____Ora di inizio (UTC+1):_____Durata (min)_____

Pressioni riscontrate _____

	Coordinate UTM33T - WGS84	
Numero individui	X	Y

AYTHYA : Scheda per il campionamento di *Uccelli Aythya niroca*

Codice area:_____Rilevatore:_____

Coordinate del centroidi UTM33TWGS84 : longitudine (X)_____latitudine(Y)_____

Data:_____Ora di inizio (UTC+1):_____Durata (min)_____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Età	Attività

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: adulto, giovane, pulcino

Attività: comportamento territoriale, in alimentazione, in volo

CANIS FOTOTRAPPOLE : Scheda per il campionamento di *Canis lupus* con fototrappole

Codice fototrappola: _____ Rilevatore: _____

Cordinate UTM33T WGS84 : longitudine (X) _____ latitudine (Y) _____

Data montaggio: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____

Data smontaggio: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____

(in caso di batteria scaricata prima della data di smontaggio, segnare la data di ultima registrazione)

Pressioni riscontrate _____

Data	Orario (UTC+1)	Numero individui	Comportamento

Comportamento: spostamento, segue preda (se nelle immagini precedenti sono registrate prede), gioco, comportamento gerarchico, comportamento sessuale, marca il territorio

CANIS TRANSETTI : Scheda per il campionamento di *Canis lupus* con Snow tracking su neve

Codice transetto:_____Rilevatore:_____

Data:_____Ora di inizio (UTC+1):_____Durata (min)_____

Pressioni riscontrate _____

Numero minimo individui stimati	Tipo rilevamento	Comportamento	Coordinate UTM33T - WGS84	
			X	Y

Tipo: feci, orma, urina, urina con sangue

Comportamento: caccia (tracce caotiche), spostamento (tracce lineari)

CANIS WH : Scheda per il campionamento di *Canis lupus* con Wolf howling

Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Codice plot	Coordinate UTM33T - WGS84		Numero minimo individui stimati	
	X	Y	adulti	giovani

Registrare anche i plot in cui non si è avuta risposta

CARETTA : Scheda per il campionamento di *Caretta caretta*

Codice PTD_____ Rilevatore:_____

Data:_____ Ora di inizio (UTC+1):_____ Durata (min)_____

Pressioni riscontrate _____

Segnalazione di riproduzione	Coordinate UTM33T – WGS84 della posizione	
Tipo di segnalazione (nido con uova, nido senza uova, tracce di emersione, adulto)	X	Y

Altri parametri rilevati	Valori
Numero di uova	
Numero di nati	

CHIROTTERI : Scheda per il campionamento di *Chiroteri*

Codice plot: _____ Rilevatore: _____

Coordinate UTM33T-WGS84 : X _____ Y _____

Tipo rifugio: cavità naturale, cavità antropica, cavità arborea, altro

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Tipo rilevamento	Attività	Sesso

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Tipo: censimento visivo al roost, cattura, con bat detector

Svernamento: svernamento, riproduzione, swarming

COLEOTTERI : Scheda per il campionamento di *Coleotteri*

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Età	Coordinate UTM33T - WGS84	
				X	Y

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età. adulto, larva

ELAPHE : Scheda per il campionamento di *Elaphe quatuorlineata*

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Attività	Coordinate UTM33T - WGS84	
				X	Y

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: giovane, adulto

Attività: accoppiamento, depone uova, prende il sole, sotto un rifugio artificiale

EMYS : Scheda per il campionamento di *Emys orbicularis*

Codice plot: _____ Rilevatore: _____

Coordinate UTM33T - WGS84 : longitudine (X) _____ latitudine (Y) _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Attività

Attività: accoppiamento, prende il sole

ITTIOFAUNA : Scheda per il campionamento di *Pesci e Lamprede*

Transetti in acque lentiche / lotiche (sottolineare la tipologia di habitat)

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Età	Coordinate UTM33T - WGS84	
			X	Y

Età: adulto, lorva (lamprede) o avanotto (pesci)

LEPIDOTTERI : Scheda per il campionamento di *Lepidotteri*

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Attività	Coordinate UTM33T - WGS84	
				X	Y

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Attività: comportamento territoriale, accoppiamento, depone uova, migrazione, in alimentazione

LUTRA : Scheda per il campionamento di *Lutra lutra*

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

	Coordinate UTM33T - WGS84	
Tipo rilevamento	X	Y

Tipo: spraint, orma

ODONATI : Scheda per il campionamento di *Odonati*

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Attività	Coordinate UTM33T - WGS84	
				X	Y

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Attività: comportamento territoriale, tandem, accoppiamento, depone uova

RAPACI_ARB : Scheda per il campionamento di *Uccelli Circaetus, Milvus e Pernis*

Codice area: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Età	Coordinate UTM33T WGS84		Nido o centroide
				X	Y	

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: adulto, giovane, pulcino

Attività: comportamento territoriale, in alimentazione, in volo

ROSALIA : Scheda per il campionamento di *Rosalia alpina*

Codice plot: _____ Rilevatore: _____

Coordinate UTM33T - WGS84 : longitudine (X) _____ latitudine (Y) _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Numero individui	Sesso	Età

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età. adulto, larva

TESTUDO : Scheda per il campionamento di *Testudo hermanni*

Codice plot: _____mq _____Rilevatore: _____

Coordinate del centroide del plot (UTM33T - WGS84) X_____Y_____

Data: _____Ora di inizio (UTC+1): _____Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

	Coordinate UTM33T – WGS84 della posizione dell'individuo	
Sigla individuale	X	Y

Altri rettili nel plot

Specie	Numero individui stimati nel plot

UCCELLI_PLOT : Scheda per il campionamento di *Uccelli con plot*

Codice plot: _____ Rilevatore: _____

Coordinate UTM33T WGS84 : longitudine (X) _____ latitudine (Y) _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Età	Attività	Distanza

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: adulto, giovane, pulcino

Attività: comportamento territoriale, in alimentazione, in volo

Distanza: da rilevare con telemetro

UCCELLI_TRANSETTO : Scheda per il campionamento di *Uccelli su transetto*

Codice transetto: _____ Rilevatore: _____

Data: _____ Ora di inizio (UTC+1): _____ Durata (min) _____

Pressioni riscontrate _____

Specie	Numero individui	Sesso	Età	Attività	Distanza	Coordinate UTM33T WGS84	
						X	Y

Sesso: maschio, femmina, non determinato

Età: adulto, giovane, pulcino

Attività: comportamento territoriale, in alimentazione, in volo

Distanza: da rilevare con telemetro, rappresenta la distanza perpendicolare dell'animale rilevato dal transetto (non dal rilevatore)